

IO. CHRIST. FABRICII
 PROFESS. HAVNIENS. SOC. REG. NORV. ET
 BEROL. MEMBR.

SYSTEMA
 ENTOMOLOGIAE,
 SISTENS
 INSECTORVM
 CLASSES, ORDINES, GENERA,
 SPECIES,
 ADIECTIS
 SYNONYMIS, LOCIS, DESCRIPTIONIBVS,
 OBSERVATIONIBVS.



MY COPY

FLENSBURGI ET LIPSIAE
 IN OFFICINA LIBRARIA KORTII

1775.

FORMICA. *Palpi inaequales, articulis cylindricis.*

Labium submembranaceum, cylindricum, truncatum, apice palpigerum.

Antennae filiformes.

Nigra, abdomine ovato, pedibus ferrugineis. Linn. *herculeana.*
Syst. Nat. II. 962. I. Fn. Sv. 1720.

Formica magna. Hippomyrmex. Linn. It. Gotl. 232.

Formica maxima. Raj. Inf. 69.

Fn. carn. 832.

Habitat in Europae, Americae truncis putrescentibus,
ruribunda.

Nigra, atra, pedibus rufis.

Habitat in Brasilia. Mus. Banks.

rufipes.

Nigra. Caput magnum, ovatum, postice subdidymum, atrum, pilis ferrugineis hirtum. Antennae apice fuscae. Thorax hirtus, niger, postice compressus. Abdomen ovatum, hirtum, nigrum. Squama ovata, obtusa. Pedes rufi.

Nigra, capite rufo, squama petiolari, didyma.

Habitat in nova Hollandia. Mus. Banks.

erythrocephala.

Capitulum magnum, oblongum, rufum. Antennae rufae.

Thorax filiformis, tenuissimus, ater, immaculatus.

Squama petiolaris, brevis, erecta, didyma. Abdomen oblongum, atrum. Pedes atri, plantis rufis.

Nigra, thorace compresso pedibusque ferrugineis.

Formica rufa thorace compresso, toto ferrugineo, capite ab domine que nigris. Linn. Syst. Nat. II. 962.

Fn. Sv. 1721.

rufa.

Formica fusca, thorace fulvo. Geoff. Inf. 2. 428.

Formica media rubra. Raj. Inf. 69.

Habitat in Europae, Americae acervis acerofisis, sylvaticis, pungens aculeo obsoleto.

Formicarum res publica consistit maribus foeminisque alatis, incuriis, gulac deditis spadonibusque

numerofis, indefessis. Hae corradiunt quisquiliis acervum, sustentant mares foeminasque sub nup et peractis puerperis parentes expellunt, rete liberis pro conservatione familiae.

- pubescens.* 5. F. atra, abdomine pubescente.
Habitat in Hungaria. *Mus. Tottianum.*
Statura F. rufae. Totum corpus atrum, immaculatum.
Abdomen pilis cinerascentibus pubescit.
- nigra.* 6. F. nigra, nitida, ano piceo.
Formica nigra tota nigra, nitida, tibiis cinerascentibus. *Linn. Syst. Nat. II. 963. 5. Fn. Sv. 1723.*
Formica atra. *Geoff. Inf. 2. 429.*
Formica minor e fusco nigricans. *Raj. Inf. 69.*
Scop. carn. 834.
Habitat in Europae terra.
- obsoleta.* 7. F. supra nigra, subtus testaceo-rufa, abdomine globoso. *Linn. Syst. Nat. II. 963. 6. Fn. Sv. 1724.*
Habitat in Europae terra.
- 4 punctata.* 8. F. thorace compresso, ferrugineo, abdomine punctis quatuor niveis.
Formica 4 punctata rubra, abdomine nigro: punctis quatuor albis. *Linn. Mant. I. 541.*
Habitat in Alsafia, capta d. XV. Maj.
Caput globosum, atrum, antennis ferrugineis. Squama petiolaris, brevis, obtusa. Abdomen atrum nitidum, primo secundoque segmento utrinque puncto albo. Pedes ferruginei, femoribus nigri.
- virescens.* 9. F. pallida, capite abdomineque virescentibus.
Habitat in nova-Hollandia. *Mus. Banks.*
Angusta. Caput virescens, maxillis antennisque pilosis. Thorax tenuissimus, inermis, pallidus. Petiolus abdominalis elongatus, pallidus, tuberculatus parvo, elevato. Abdomen subrotundum, virescent. Pedes pallidi.
- sacchari-vora.* 10. F. nigra, pedibus, antennis maxillisque rufis. *Linn. Syst. Nat. II. 963. 10.*
Formica minima saccharivora. *Brown. Jam. 440.*
Habitat in America intra culmos sacchari nidificans quos destruit.

12. *F. atra*, capite, antennis plantisque ferrugineis, *barbara*.
petiolo binodi. *Linn. Syst. Nat.* II. 962. 2.
Habitat in Africa.

13. *F. nigra*, thorace rufo, postice bidentato, petiolo binodi. *aegyptiaca*.
Habitat in Aegypto. *Forskahl.*

Parva. Caput magnum, fuscum, antennis ferrugineis.
Thorax compressus, fuscus, postice bidentatus.
Abdomen fuscum. Pedes ferruginei, femoribus
subclavatis.

14. *F. nigra*, capite maximo, rufo, petiolo binodi. *binodis*.
Habitat in Aegypto. *Forskahl.*

Media. Caput abdomine majus, rufum, immaculatum. Thorax compressus, angustissimus, niger.
Petiolus nodis duobus, antico majori. Abdomen parvum, subrotundum, nigrum. Pedes rufi, femoribus ferrugineis.

15. *F. nigra*, abdominalis petiolo binodi, scutello bi-dentato. *caespitum*.

Formica caespitum abdominalis petiolo binodi: priore subtus thoraceque supra bidentato. *Linn. Syst. Nat.* II. 963. II. *Fn. Sv.* 1726.

Formica binodis. *Linn. Amoen. Acad.* 6. 413. 94.

Scop. carn. 837.

Act. Berol. vol. 5.

Hamb. Mag. 5. p. 393.

Habitat in Europae pratis siccioribus sub muscis. Mares foeminaeque examinant medio Augusti, meridie calido, more Phryganeorum in aere choreas agentes, turma volatili, depluentes per paria iuncta. *Linn.*

16. *F. rufa*, capite abdominalisque fascia nigris, petiolo *tuberum*.
binodi.

Habitat in Suecia.

Praecedente minor. Antennae rufae, apice nigrae.
Thorax ferrugineus, postice bidentatus.

17. *F. nigra*, thorace inermi, squama petiolari, bispinosa. *australis*.
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Corpus medium, totum nigrum, tomento cinereo, subnitente. Squama petiolaris, crassa, obtusa, spinis duabus incurvis, validis.

- biserrata*. 17. F. thorace bidentato, squama petiolari duplicita.
Habitat Cajennae. *Maller.*
Caput piceum, postice utrinque acuminatum. Thorax elevatus, gibbus, postice bidentatus. Petiolus squamis duabus ovatis, brevibus. Abdomen globosum, piceum, linea dorsali nigra. Alae subferruginea.
- clavata*. 18. F. nigra, thorace bidentato, abdominis petiolata subtus unidentato.
Habitat in India.
Corpus magnum, nigrum, oculis testaceis. Caput thorace latius, maxillis concavis, validis. Thorax gibbus, medio bidentatus. Petiolus nodo elevatus, gibbo et sub hoc nodo dens acutus, validus. Abdomen ovatum, primo segmento globo.
- Atta laboi*. 19. F. thorace bispinoso, nigra, pedibus ferruginea, capite postice attenuato.
Habitat in Brasilia. *Muf. Banks.*
Magna. Caput scabrum, nigrum, immaculatum, postice attenuatum. Thorax tenuis, niger, postice ferrugineus, spinis duabus approximatis, validis, incurvis. Squama petiolaris ovata, crassa, obtusa. Abdomen fuscum, pubescens. Pedes ferruginei.
- Ammon*. 20. F. thorace bispinoso, squama petiolaris, spinis duabus incurvis.
Habitat in nova Hollandia. *Muf. Banks.*
Caput parvum, ovatum, inerme, nigrum. Thorax compressus, submarginatus, niger, dorso tomento aureo, nitente; postice spinis duabus, rectis validis. Squama petiolaris ovata, truncata, spinis duabus valde incurvis. Abdomen subrotundum, nigrum, tomento aureo. Pedes nigri.
- bihamata*. 21. F. thorace quadrispinoso, squama petiolaris spinis duabus arcuatis.
Formica bihamata. Drury Inf. 2. tab. 38. fig. 7. 8.
Habitat in insula St. Iohannis Indiae.
Caput parvum, subrotundum, inerme, antennae fere longitudine corporis. Thorax compressus, ferrugineus, antice utrinque spina porrecta, elongata, arcuata; in medio spinae duas recurvatae, acutissimae; postice tubercula duo fere obsoleta. Squa-

Squama petiolaris porrecta, basi cylindrica, ferruginea; ultra medium fissa in spinas duas arcuatas, nigras. Abdomen subglobosum, nigrum, basi ferrugineum. Pedes elongati, nigri, femoribus ferrugineis.

♂ *F. thorace quadrispinoso, capite didymo, magno, cephalotes. utrinque postice mucronato.* Linn. Syst. Nat. II. 964. 15.

Formica magna. Marcgr. bras. 252.

Merian. Surr. tab. 18. fig. majores.

Seb. Mus. 4. tab. 99. fig. 6.

Habitat in America meridionali.

♀ *F. thorace sexspinoso, capite didymo, maximo. 6 dens.* Linn. Syst. Nat. II. 964. 14.

Habitat in America meridionali.

♀ *F. thorace quadrispinoso, capite depresso, marginato, utrinque bispinoso.* Linn. Syst. Nat. II. 965. 16. *atrata.*

Tapiai. Marcgr. bras. 252.

Seb. Mus. 4. tab. 99. fig. 7.

Habitat in America meridionali.

♂ *F. rufa, abdome apice nigro, primo segmento gulosae. contracto, maxillis porrectis.*

Habitat in nova Hollandia. Mus. Banks.

Magna. Caput ovatum, rufum, maxillis porrectis, longitudine capitatis, dentatis, pallidis. Thorax inermis, medio compressus, rufus. Petiolus abdominalis elongatus, tuberculo magno, subrotundo. Abdomen rufum, nitidum, apice atrium; primum segmentum breve, contractum, campaniforme. Pedes rufi.

♀ *F. squama petiolaris conica, acutissima, capite subdidymo, maxillis porrectis.* Linn. Syst. Nat. II. da. 965. 17.

Habitat in America meridionali.

Oblonga. Maxillae porrectae, edentulae, obscure rufae. Caput rufescens, oculis orbiculatis, atris. Thorax inermis, niger. Alae hyalinae.

maxillosa. 27. F. thorace sexdentato, capite flavescente: ~~maxilla~~ longitudine capitis.

Habitat in India. *Mus. Hagense.*

Caput maximum, flavescens, oculis nigris maxillaribus porrectis parallelis, longitudine capitis. Thorax spinis sex, anticis duabus validis, intermediis tenuis, recurvis, posticis brevissimis. Abdomen subrotundum, fuscum.

123. MVTILLA. *Palpi* inaequales, articulis obconicis.

Labium porrectum, cornutum, obconicum, gibbum, apice palpigerum.
Antennae filiformes.

occidens. 1. M. coccinea, abdomine cingulo nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 966. I.

Peruv. Mus. 404.

— *Gazoph. tab. 13. fig. 10.*

— *Filic. 404. tab. II. fig. 4.*

Catesb. Carol. 3. p. 15. tab. 15.

Sultz. Inf. tab. 19. fig. 9.

Habitat in America septentrionali.

Aculeus reconditus, punctorius.

antiquens. 2. M. coccinea, abdominis apice nigro: strigis albis.

Habitat in insula Antigua. *Drury.*

Praecedenti dimidio minor. Caput coccineum, oculis nigris. Thorax coccineus, immaculatus. Abdomen ovatum, coccineum, macula parva basi nigra. Apex niger, strigis tribus albis subobsoletis. Pedes nigri.

america. 3. M. atra, abdomine maculis quatuor flavescens, lineisque tribus albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 966. 2.

Habitat in America australi.