

249. FORMICA. *Palpi* quatuor inaequales: articulis cylindricis; in apice labii submembranacei cylindrici.

Antennae filiformes.

Squamula erecta, thoraci abdominique interjecta.

Aculeus feminis et neutris reconditus.

Alae maribus et feminis, at neutris nullae.

herculanea. 1. F. nigra, abdomine ovato, pedibus ferrugineis. *Fn. suec.* 2. n. 1720.* *Scop. ent. carn.* 832. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 488. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 307. n. 1.

Fn. suec. 1. n. 1019. Formica magna.

It. gotl. 232. Formica magna Hyppomyrmex.

Raj. inf. 68. Formica maxima.

Habitat vagabunda in Europae, Americae truncis putrescentibus.

compref- 10. F. nigra, thorace compresso, antennis apice femoribusque
sa. rufis, capite maximo. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 307. n. 2.
Habitat Tranquebariae, antennarum articulo primo maximo nigro, mandibulis porrectis apice bifidis, squama petiolarum ovata, integra.

smaragdi- 20. F. viridis, thorace flavo sublineato. *Fabr. sp. inf.* 1. p.
na. 488. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 307. n. 3.

Habitat in India.

rufipes. 21. F. hirta atra, pedibus rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 488. n. 3.
mant. inf. 1. p. 307. n. 4.

Habitat in Brasilia.

erythro- 22. F. atra, capite rufo, squama petiolarum didyma. *Fabr. sp.*
cephala. *inf.* 1. p. 488. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 307. n. 5.

Habitat in nova Hollandia.

barbara. 2. F. atra, capite, antennis plantisque ferrugineis, petiolo binodi. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 491. n. 16. *mant. inf.* 1. p. 308. n. 19.

Habitat