

Habitat in Africa, heracleanae magnitudine, capite magnis alisque stemmatibus, antennarum articulo primo majore nigro. Brauder.

- viatica. 23. *F. ferruginea*, abdomine ovato nigro. *Fabr. mant. inf. 1. p. 308. n. 20.*
Habitat in Hispaniae viis, velocissime cursitans, mediae magnitudinis, maxillarum apice nigro, abdomine glabro.
- pallipes. 24. *F. atra nitida*, antennis pedibusque albidis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 309. n. 21.*
Habitat in Cayenna, parva, capite parvo rotundato, thorace gibbo. Squama integerrima truncata, abdomine ovato, alis albis.
- egyptia- 25. *F. nigra*, thorace rufo posteriore bidentato, petiolo binodi.
 ca. *Fabr. sp. inf. 1. p. 491. n. 17. mant. inf. 1. p. 309. n. 22.*
Habitat in Aegypto.
- binodis. 26. *F. nigra*, capite maxime rufo, petiolo binodi. *Fabr. sp. inf. 1. p. 491. n. 18. mant. inf. 1. p. 309. n. 23.*
Habitat in Aegypto.
- rufa. 3. *F. nigra*, thorace compresso pedibusque ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 489. n. 6. mant. inf. 1. p. 308. n. 7.*
Syst. nat. XII. 2. p. 962. n. 3. Fn. suec. 2. n. 1721. Formica thorace compresso toto ferrugineo, capite abdomineque nigris.*
Raj. inf. 69. Formica media rufa.
Fn. suec. 1. n. 1020. Scop. ent. carn. 836. Formica rufa.
Degeer inf. II. 2. p. 305. n. 1. t. 41. f. 1. 2. Formica ferruginea.
Geoffr. inf. par. 2. p. 428.
Schueff. elem. t. 64.
ic. t. 5. f. 3.
Needham mem. Bruxell. T. II.
Habitat in Europae, Americae acervis arenosis sylvaticis, magnus aculeo obsoleto.
- didyma. 27. *F. nigra*, abdomine cinerascens, squama petiolarum didyma.
Fabr. sp. inf. 1. p. 489. n. 5. mant. inf. 1. p. 308. n. 6.
Habitat in Italia, statura rufae, antennis tibiisque piceis, thorace gibbo, abdomine ovato cinereo pubescente.
- pubescens. 28. *F. atra*, abdomine pubescente. *Fabr. sp. inf. 1. p. 489. n. 7. mant. inf. 1. p. 308. n. 8.*
Habitat in Hungaria et Calabria.