

Mant. I. p. 541. Formica rubra, abdomine nigro: punctis quatuor albis.
Habitat in Allatia.

virescens. 32. F. pallida, capite abdomineque virescentibus. *Fabr. Sp. inf. I. p. 490. n. 13. mant. inf. I. p. 308. n. 16.*
Habitat in nova Hollandia.

saccharivora. 10. F. nigra, pedibus, antennis maxillisque rufis. *Fabr. Sp. inf. I. p. 490. n. 14. mant. inf. I. p. 308. n. 17.*
Brown. Jam. 440. Formica minima saccharivora.
Habitat in America, intra vulnos sacchari nidificans, quos destruit, magnitudine f. caespitum, pilis albidis adspersis, squama petioli crassa integra.

maculata. 33. F. nigra, thorace posterius femoribusque ferrugineis, abdomine pallido-maculato. *Fabr. Sp. inf. I. p. 491. n. 15. mant. inf. I. p. 308. n. 18.*
Habitat in Africa aequinoctiali, mediae magnitudinis, capite magno atro: maxillis brevibus multidentatis, antennis apice piceis, abdomine ovato piloso.

caespitium. 11. F. nigra, abdominis petiolo binodi, scutello bidentato. *Fabr. Sp. inf. I. p. 491. n. 21. mant. inf. I. p. 309. n. 26. Syst. nat. XII. 2. p. 963. n. 11.* Formica abdominis petiolo binodi, priori subtus thoraceque supra bidentato.
*En. Suec. 1726.** Formica petiolo nodis duobus alternis: posteriore majore.
*Amoen. acad. 6. p. 413. n. 94.** Formica (binodis) nigra, abdomine glaberrimo: segmentis duobus primis subglobosis.
Gleditsch act. Berol. vol. 5.
At. Havn. 10. I. t. I. f. 1-3.
Hamb. Magaz. 5. p. 393.
Scop. ent. carn. 837.
Sulz. hist. inf. t. 17. f. 20-22.
Degeer inf. II. 2. p. 334. n. 7. t. 43. f. 21. 22.

Habitat

Formicarum, quae, Indiae Americaeque australis summa calamitas, a myrmecophagis destruantur, maribus feminisque alatis incuriis gulae deditis et spadonibus numerosis apteris, indefessis consistit; hae corradunt quisquilias in acervum; suscipiunt mares feminasque sub nuptiis, at exactis puerperis parentes expellunt, retentis pro conservatione familiae liberis. Proprio acidi genere foetae, quisquilis, rapina, saccharo, fructibus e. c. visitant, rejectaneis piscium retibusque his immersis verborumque truncis circumligatis pelluntur; larva apud mollis alba, utrinque obtusa, pupa immobilis lusciniarum esca gratissima; an hujus generis formica morsicans maligna Forskählii?