

*Habitat in Europae pratis ficcioribus sub muscis; mares feminaeque Augusti medio meridie calido examinant, phryganearum more in aëre choreas agentes turba volatili, depluentes per paria juncta, magnitudine nigrae, abdomine ovato, pedibus testaceis; alis hyalinis sine stigmatibus, non pungens.*

tuberum. 34. *F. rufa*, capite abdominisque fascia nigris, petiolo binodi. *Fabr. sp. inf. I. p. 492. n. 22. mant. inf. I. p. 309. n. 27.*

*Habitat in Suecia.*

australis. 35. *F. nigra*, thorace inermi, squama petiolari bispinosa. *Fabr. sp. inf. I. p. 492. n. 23. mant. inf. I. p. 309. n. 28.*

*Habitat in nova Hollandia.*

grossa. 36. *F. nigricans*, thorace sub scutello bidentato, abdomine magno globoso. *Fabr. mant. inf. I. p. 309. n. 29.*

*Habitat in Cayenna, magna, pedibus antennisque piceis, his apice cinerascens, thorace gibbo, alis ferrugineis.*

omnivo- 12. *F. thorace punctis elevatis, petiolo binodi, corpore testaceo, abdomine minuto.* *Fabr. sp. inf. I. p. 491. n. 19. mant. inf. I. p. 309. n. 24.*

*Degeer inf. 3. p. 641. n. 9. t. 31. f. 23. 24. Formica pulla.*

*Brown. jam. 440. Formica domestica omnivora.*

*Habitat in America meridionali, insulisque oppositis, omnia cibaria consumens et dilacerans, minuta, abdomine fusco, pilis albis vix conspicuis hirto.*

flava. 37. *F. flava*, abdomine ovato pubescente. *Fabr. sp. inf. I. p. 491. n. 20. mant. inf. I. p. 309. n. 25.*

*Degeer inf. II. 2. p. 326. n. 5. t. 42. f. 24. 28.*

*Habitat in Europae borealis silvis, parva.*

bidens. 13. *F. thoracis gibbere bidentato, capite ovato, antennis ferrugineis: articulo infimo nigro.* *Fabr. sp. inf. I. p. 492. n. 24. mant. inf. I. p. 309. n. 26.*

*Degeer inf. 3. p. 600. n. 1. t. 31. f. 1. 2.*

*Habitat in Surinamo.*

biscutata. 38. *F. thorace bidentato, squama petiolari duplicata.* *Fabr. sp. inf. I. p. 492. n. 25. mant. inf. I. p. 309. n. 27.*

*Habitat in Cayenna.*