

Degeer inf. 3. p. 604. n. 5. t. 31. f. 11. Formica migratoria.
Merian. surin. t. 18. fig. maj.

Seb. musf. 4. t. 99. f. 6.

Habitat in America meridionali, ferrugineo-pubescent, abdominis petiolo bituberculato.

atrata. 16. F. thorace quadrispinoso; capite depresso marginato, utrinque bilpinofo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 493. n. 33. mant. inf. 1. p. 310. n. 40.*

Maregr. brasf. 252. Tapitai.

Degeer inf. 3. p. 609. n. 7. t. 31. f. 17. Formica quadridens.

Seb. musf. 4. t. 99. f. 7.

Habitat in America meridionali, atra, capite obtuso: maxillis brevissimis, petiolo abdominis bituberculato.

gulosa. 45. F. rufa, abdomine apice nigro: segmento primo contracto, mandibulis porrectis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 494. n. 34. mant. inf. 1. p. 310. n. 41.*

Habitat in nova Hollandia.

forficata. 46. F. fusca, abdomine pubescente nigro: segmento primo contracto, mandibulis porrectis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 310. n. 42.*

Habitat in Terra van Diemen, gulosae proxime affinis, maxillis forficatis intus dentatis, petioli nodo magno globoso, pedibus obscure ferrugineis.

rostrata. 47. F. thorace compresso anterieus tridentato, mandibulis porrectis incurvis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 310. n. 43.*

Habitat in Cayenna, parva, nigra, squama intermedia, abdomineque pubescente ovatis.

hamata. 48. F. ferruginea, capite maximo pallido, mandibulis porrectis hamatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 494. n. 35. mant. inf. 1. p. 311. n. 44.*

Habitat in Cayenna, mediae magnitudinis, capite subrotundo, nitido; basi utrinque spinoso, maxillis capite longioribus, basi tenuioribus, antennisque praeter apicem nigris, petiolo binodi.

haemato- 17. F. squama petiolari conica acutissima, capite subdidymo, da. mandibulis porrectis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 494. n. 36. mant. inf. 1. p. 311. n. 45.*

Degeer inf. 3. p. 601. n. 2. t. 31. f. 3. Formica maxillofa.