

INSECTA HYMENOPTERA. Formica.

Habitat in America meridionali, nigra, capite oblongo, depressusculo, maxillis rubris edentulis, thorace inermi, pedibus flavis, alis hyalinis.

- maxillo-
sa. 49. F. thorace sexdentato, capite flavescente, mandibulis longitudine capitis. *Fabr. sp. inf. I. p. 494. n. 37. mant. inf. I. p. 311. n. 46.*
Habitat in India.
- foetida. 18. F. gibbere petiolari *transverse* compresso, abdominis primo segmento contractiore, maxillis porrectis.
Habitat in America meridionali, capite nigro: punctis supra tribus elevatis, maxillis longiusculis, thorace inermi, abdomine pedibusque pilosis, alis hyalinis.
- nigra. 50. F. nigra, abdomine ovato piloso. *Scop. ent. carn. 833. Schrank inf. austr. p. 414. n. 835.*
Habitat in Germaniae superioris arboribus putridis, et sub carioso cortice, lignum omne meatibus multifariam partitis perterebrans.
- renosa. 51. F. capite thoraceque nigris abdomine cylindrico fusco brevioribus, squama integra crassa, pedibus testaceis, alis albis: venis testaceis maculaque marginali fulca. *Mus. Lesk. p. 81. n. 533.*
Habitat - - - -
- melano-
pis. 52. F. rufa, oculis nigris, abdominis dorso fusco, squama integra. *Mus. Lesk. p. 81. n. 534.*
Habitat in Europa.
- glabra. 53. F. nigra glabra, squama petiolari bidentata, abdominis incisuris albidis, pedibus rufis. *Mus. Lesk. p. 81. n. 536.*
Habitat in Europa.
- testacea. 54. F. testaceo-fusca subpubescens, antennis pedibusque testaceis, alis albis, basi ferrugineo-dilatatis. *Mus. Lesk. p. 81. n. 537.*
Habitat in Europa.
- fusces-
cens. 55. F. nigra, capite abdominis latitudine, squama brevissima, ore antennis pedibusque rufo-fuscescentibus. *Mus. Lesk. p. 81. n. 540.*
Habitat in Europa: