

VI. DIPTERA.

Alae duae.

Halteres clavati, solitarii pone singulas alas
sub squamula propria.251. OESTRUS. *Haustellum* retractum intra labia
tumida connata: poro parvo;
palpi nulli.*Vagina* membranacea, cylindrica,
obtusata, includens fetas tres
membranaceas, flexiles, bre-
ves, reflexas.*Antennae* breves, setaceae.bovis. I. Oe. alis immaculatis, abdomine nigro: basi albo apiceque
fulvo. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 399. n. 5.
Syst. nat. XII. 2. p. 970. n. 4. *Fn. suec.* 1733.* Oestrus alis
immaculatis, thorace nigro: scutello pallido, abdomine
nigro; basi albo apiceque fulvo.*Raj. inf.* 271.*Derham theol.* l. 8. c. 6; n. II.*Vallin. nat.* 1. t. 28.*Reaum. inf.* 4. t. 38. f. 38.*Frisch inf.* 5. p. 25. t. 7.*Geoffr. inf. par.* 2. p. 456. n. 3.*Sulz. inf. t.* 20. f. 127.*Schaeff. elem. t.* 91.*Degeer inf.* 6. p. 297. n. 2. t. 15. f. 22.*Habitat larva* intra boum aliorumque pecorum dorsum,
eorum humoribus nutrita, atque tubercula subcutanea ex-
citans.*Hoc illud insectum, cui nomen Asilo**Romanum est. Oestrum graji vertere vocantes,**Asper, acerba sonans, quo toto exterrita silvis**Diffugiunt armenta.*

Virg.

buccatus, 6. Oe. griseus, facie alba nigro punctata. *Fabr. sp. inf.* I.
p. 398. n. I. *mant. inf.* 1. p. 321. n. I.
Habitat in Carolina australi.

7. Oe.