

385.

AZy 96. III. 281-87. Nov. XXI. 279-89. L. 93. III. 573-76.

RECORDED
IN LIBRARY



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Class

BIOLOGY
LIBRARY
G



JOH. CHRIST. FABRICII

HIST. NAT. OEC. ET CAMERAL. P. P. O. SOCIET. HAFN.
NORW. BEROL. LIPS. LUND. PETR. PARIS. AGRIC.
HIST. NAT. ET PHILOM. MEMBR.

ENTOMOLOGIA
SYSTEMATICA
EMENDATA ET AUCTA.


SECUNDUM

CLASSES, ORDINES, GENERA, SPECIES

ADJECTIS

SYNONIMIS, LOCIS, OBSERVATIONIBUS,
DESCRIPTIONIBUS.

T O M. II.



HAFNIAE,
IMPENSIS CHRIST. GOTTL. PROFT.
MDCCXCII.



ferrugineum ante alas. Abdomen glabrum, atrum utrinque maculis duabus fasciisque duabus posticis, flavis. Fascia postica terminatur striga rufescente. Pedes omnes rufi.

striata.

9. N. ferruginea thorace nigro lineato, abdome rufo flavo maculato.

Habitat in Europa Mus. Dom. Lund.

Statura & magnitudo N. Fabriciana. Antennae ferrugineae. Caput ferrugineum macula magna, media nigra. Thorax supra ferrugineus lineis tribus nigris, subtus niger, ferrugineo maculatus. Abdomen glabrum, rufum, nitidum segmento primo & secundo nigro immaculato, tertio quartoque utrinque puncto flavo, quinto punctis duobus dorsalibus, sexto majori, dorso fali, quadrato. Pedes rufi. Alae albidae apice fuscescentes.

- Fabriciana.* 10. N. nigra abdome glabro ferrugineo: maculis duabus flavis.

Apis Fabriciana. Linn. Syst. nat. 2. 955. 7.

Habitat Upsaliae.

N. ruficorni affinis attamen distincta.

- fulvicornis.* 11. N. nigra antennis pedibusque ferrugineis, scutello punctis quatuor abdomineque fasciis flavis,

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino N. ruficornis at alia & distincta.

Caput nigrum labio flavo postice tridentato. Antennae cylindricae, rufae articulo primo subtus flavo. Thorax niger margine antico, puncto calloso sub alis quatuorque scutelli flavis. Abdomen atrum fasciis quinque flavis: secunda parum interrupta. Pedes ferruginei.

gibba.

12. N. nigra abdome rufo apice nigro.

Nomada succincta. Scop. Ann. Hist. nat. 4. 45. 2.

Habitat in Anglia.

Statura praecedentium. Abdomen glabrum, rufum, nitidum, apice nigrum.

Variat sexu abdomine toto rufo.

13. N. nigra abdomine rufo: segmento primo toto *albilabris*, nigro.

Habitat Kiliae.

Nimis affinis N. gibbae. Caput nigrum labio argenteo. Thorax niger, immaculatus. Abdomen rufum segmento primo nigro. Alae obscurae. Pedes nigri.

14. N. nigra abdominis segmento secundo ferrugineo: maculis tribus nigris. *Hattorfiana*

Habitat in Germania Dom. de Hattorf.

Caput & thorax atra, nitida, immaculata. Abdominis segmentum primum atrum, nitidum margine ferrugineo, secundum ferrugineum maculis tribus nigris, intermedia majori, quadrata. Segundum tertium quartumque nigra marginibus albis, quintum nigrum ano rufescente. Pedes nigri, postici lanugine alba testi.

15. N. cihereo villosa abdome glabro nigro: segmento secundo tertioque ferrugineis. *cingulata*.

Habitat in Sueciae nemoribus.

Statura praecedentium. Alae albae.

Variat sexu abdomine rufo.

161. FORMICA. *Palpi* quatuor inaequales; articulis cylindricis.

Labium submembranaceum, cylindricum, apice palpigerum.
Antennae filiformes.

1. F. nigra abdome ovato, pedibus ferrugineis. *herculeana*.
Linn. Syst. nat. 2. 962. 1. Fn. Sv. 1728.

Linn. It. Gottl. 232.

Raj. Inf. 69.

Scopol. carn. 832.

Habitat in Europae, Americae truncis putrescentibus vagabunda.

compreffa. 2. F. nigra thorace compresso, antennis apice femoribusque rufis; capite maximo.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Caput maximum, atrum, minime nitidum, Antennae ferrugineae articulo primo maximo, nigro. Mandibulae porrectae, apice bifidae. Thorax compressus, niger, immaculatus. Abdomen ovatum, nigrum. Squama petiolaris ovata, integrata. Pedes nigri, femoribus ferrugineis.

smaragdina 3. F. viridis thorace flavo sublineato.

Habitat in India Dom. Edler.

Magna, viridis. Antennae apice subrufescentes. Thorax crassus, elevatus, viridis, flavo sublineatus. Squama petiolaris brevis, emarginata. Abdomen glabrum, rotundatum, viride. Alae magnae, albae nervis ferrugineis.

rufipes. 4. F. hirta atra pedibus rufis.

Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.

Magna. Caput magnum, ovatum, postice subdignum, atrum, pilis ferrugineis hirtum. An-

Fornicæ corpus elongatum, immarginatum, glabrum, agile, capite magno, exerto, ovato, thorace latiore oculis parvis, rotundatis, lateralibus, antennis longiusculis: articulo secundo longissimo, incurvo, medio frontis insertis, thorace elongato, compresso, tenui, abdomine petiolato; petiolo squama intergerina distincta, ovata, aculeo obsolecto, alis quatuor inaequalibus, saepius nullis, pedibus elongatis, cufosis, tarsis quinquearticulatis, colore obscuro.

tennae apice fuscae. Thorax hirtus, niger, postice compressus. Abdomen ovatum, hirtum, nigrum. Squama petiolaris ovata, obtusa. Pedes atri plantis rufis.

5. F. nigra scutello abdome pedibusque ferrugineis. *bicolor.*

Habitat in Barbaria Dom. Desfontaines.

Magnæ in hoc genere. Antennæ rufae, apice nigrae. Mandibulae ferrugineæ, apice unidentatae. Caput nigricans labio apice fronteque ferrugineis. Thorax laevis, niger scutello ferrugineo. Petiolus ferrugineus squama petiolaris brevi, rotundata, inermi. Abdomen ferrugineum, immaculatum. Alae hyalinae macula costali ferruginea. Pedes ferruginei.

6. F. atra capite rufo, squama petiolaris didyma. *erythrocephala.*

Habitat in novâ Hollandia Mus. Dom. Banks.

Caput magnum; oblongum, rufum. Antennæ rufae. Thorax filiformis, tenuissimus, ater, immaculatus. Squama petiolaris brevis, erecta, didyma. Abdomen oblongum, atrum. Pedes atri plantis rufis.

7. F. nigra abdome cinerascente, squama petiolaris didyma.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura F. rufae. Caput nigrum antennis piceis. Thorax gibbus, niger, immaculatus. Abdomen ovatum, cinereo pubescens, nitidulum. Squama petiolaris ovata, didyma vel potius late emarginata. Pedes nigri tibiis piceis.

8. F. nigra thorace compresso pedibusque ferrugineis. *rufa.*

Formica rufa thorace compresso toto ferrugineo, capite abdomineque nigris. Linn. Syst. nat. 2.

962. 3. Fn. Sv. 1721.

Formica fusca thorace fulvo. Geoff. Inf. 2. 428.
Formica ferruginea capite abdomineque brunnneis squamaque petiolari. Degeer Inf. 2. 2. 305. 1. tab. 41. fig. 1. 2.

Habitat in Europae, Ameriae acervis acerofisi, sylvaticis pungens aculeo obsoleto.

Formicarum res publica consistit maribus foeminasque alatis, incuriis, gulae deditis spadonibusque numerosis, indefessis. Hae corrundunt quisquilias in aceruum, sustentant mares foeminasque sub nuptiis & peractis puerperiis parentes expellunt retentis liberis pro conservatione familiae.

pubescens. 9. F. atra abdomen pubescente.

Habitat in Hungaria.

Statura F. rufae. Totum corpus atrum, immaculatum. Abdomen pilis cinerascentibus pubescit.

nigra. 10. F. nigra nitida ano piceo.

Formica nigra tota nigra nitida tibiis cinerascentibus. Linn. Syst. nat. 2. 963. 5. Fn. Sv.

1723.

Formica atra. Geoff. Inf. 2. 429.

Formica minor. Raj. Inf. 69.

Formica nigra squama petiolari plantis antennisque dimidiatis ferrugineis. Degeer Inf. 2. 2. 323. 4. tab. 42. fig. 16.

Swammerd. Bibl. nat. tab. 16. fig. 1-11.

Habitat in Europae terra.

fusca. 11. F. cinereo fusca antennis pedibusque ferrugineis.

Formica fusca cinereo fusca tibiis pallidis. Linn. Syst. nat. 2. 963. 4. Fn. Sv. 1722.

Formica nigra nitida squama petiolari. Degeer Inf. 2. 2. 321. 3. tab. 42. fig. 18.

Geoff. Inf. 2. 428. 5.

Raj. Inf. 69.

Habitat in Europae sylvis.

Abdomen globosum, atrum, nitidum.

12. F. flavescens abdomine obscuro: linea dor-*flavescens*.
fali nigra.

Habitat Cajennae.

Statura & magnitudo omnino praecedentium.

Caput thorace latius, flavescens oculis globosis, atris. Thorax compressus, flavescens, immaculatus. Squama petiolaris brevis, ovata, integerrima. Abdomen ovatum, magis obscurum linea dorsali atra. Pedes compressi, flavescentes.

13. F. pallida capite thoracisque dorso nigris. *melanoce-*
Tacocra Cajennenium. *phala.*

Habitat Cajennae Mus. Dom. Bosc. Destrinit
omnia calamitas Cajennenium summa, sub
terra degens.

Minuta. Caput nigrum ore antennisque palli-
dis. Thorax fuscus, subtus pallidus. Abdo-
men pallidum ano nigricante. Pedes pallidi.

14. F. testacea oculis puncto: sub abdomine ni-*rubra*.
gris. Linn. Syst. nat. 2. 963. 7. Fn. Sv. 1725.

Formica ferruginea aculeo spinisque duabus
thoracis. Degeer Inf. 2. 2. 328. 6. tab. 43.
fig. 1.

Formica minima rubra. Raj. Inf. 69.

Loewenh. Epist. 9. Sept. 1787. 107. fig. 8.

Habitat in Europae sylvaticis sub lapidibus.

15. F. nigra capite rufo, abdomine cinerascente. *cinerascens*.
Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Magna. Caput rufum mandibulis antennisque
nigris. Thorax niger, immaculatus. Abdomen

- =====
- ovatum, viridi cinerascens angulo pone me-*
edium atro. Pedes nigri. Alae anticae obscurae.
- elongata.* 16. *F. oblonga rufa abdomine pedibusque pallidioribus.*
Habitat Tranquebariae mordax adhaerens anten-
nis pedibusque Melolonthae viridis Mus. Dom.
Lund.
Media, reliquis longior. Caput magnum, ova-
tum, rufum mandibulis nigris. Thorax elon-
gatus, tenuis, compressus, rufus, immacu-
latus. Squama petiolaris nodum ovatum in
petioli medio format. Abdomen oblongum,
nudum, magis pallidum. Pedes pallidiores.
- 6 guttata.* 17. *F. oblonga atra abdomine utrinque punctis tri-*
bus albis, antennis pedibusque rufis.
Habitat in Insula St. Crucis Americae Dr. Pflug.
Media. Caput atrum ore antennisque rufis. Tho-
rax vix compressus, ater, immaculatus squa-
ma petiolaris ovata, obtusa, integra. Abdomen
ovatum, atrum, nitidum segmentis tribus
prioribus utrinque punto baseos albo. Pedes
ferruginei. Alae albidae macula marginali
nigra.
- foetens.* 18. *F. oblonga atra ano rufo, squama petiolaris sub-*
cylindrica obtusa.
Habitat in Guinea solitaria, foetidissima, reli-
quas formicas destrueas Dr. Isert.
Magna. Caput magnum, ovatum mandibulis
exsertis longitudine capitis, nigrum, imma-
culatum. Squama petiolaris elevata, subcylin-
drica, obtusa. Abdomen ovatum, atrum ano
parvo, rufo. Pedes nigri plantis subtestaceis.
- albipennis.* 19. *F. oblonga pallida thorace postice nigro, abdo-*
mine rufescente.
Habitat in Insula St. Crucis Dr. Pflug.

Statura & magnitudo praecedentium. Caput cum antennis pallidum. Thorax antice pallidus, postice nigricans scutello albo. Squama petiolaris ovata, gibba. Abdomen ovatum, ferrugineum. Alae albae puncto marginali, atro. Pedes pallidi.

20. *F. oblonga nigra ore thoraceque rufis.* *rufibarbis.*

Habitat in Gallia.

Media. Antennae nigrae. Caput nigrum ore late rufo, qui color ad latera extenditur. Mandibulae tamen nigrae. Thorax rufus, immaculatus. Squama petiolaris ovata, obtusa. Abdomen ovatum, atrum, immaculatum. Pedes nigri.

21. *F. supra nigra subtus testaceo rufa, abdomine obsoleta.*
subgloboſo.

Formica obsoleta. Linn. *Syst. nat.* 2, 963. 6.

Fn. Sv. 1724.

Habitat in Europae borealis terra.

Reliquis paullo minor.

22. *F. thorace compresso ferrugineo, abdomine 4 punctata.*
atro: punctis quatuor niveis.

Formica 4 punctata rubra abdomine nigro:
punctis quatuor albis. Linn. *Mant.* 541.

Habitat in Alsacia capta d. XV. Maj.

Caput globosum, atrum antennis ferrugineis.
Squama petiolaris brevis, obtusa. Abdomen atrum, nitidum primo secundoque segmento utrinque puncto albo. Pedes ferruginei femoribus nigris.

23. *F. pallida capite abdomineque virescentibus.* *virescens.*

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Angusta. Caput virescens mandibulis antennisque pallidis. Thorax tenuissimus, inermis, palidus. Petiolus abdominis elongatus, pal-

lidus tuberculo parvo, elevato. Abdomen subrotundum, virescens. Pedes pallidi.

- facchari-vora.* 24. F. nigra pedibus antennis mandibulisque rufis. Linn. Syst. nat. 2. 963. 10.

Formica minima faccharivora. Brown. Jamaic. 440.

Habitat in Americae meridionalis Insulis intra culmos Sacchari nidificans, quos destruit.

- maculata.* 25. F. nigra thorace postice femoribusque ferrugineis, abdomine pallido maculato.

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks.

Magna. Caput magnum, atrum mandibulis brevibus, multidentatis. Antennae apice piceae. Thorax compressus, antice niger, postice ferrugineus. Abdomen ovatum, pilosum, nigrum lateribus pallido maculatis. Pedes nigri femoribus ferrugineis.

- barbara.* 26. F. atra capite antennis plantisque ferrugineis, petiolo binodi.

Formica barbara. Linn. Syst. nat. 2. 962. 2.

Habitat in Africa.

- viatica.* 27. F. ferruginea abdomine ovato nigro.

Habitat in Hispaniae viis velocissime cursitans Mus. Dom. Vahl.

Media. Caput magnum cum antennis ferrugineum mandibulisque apice nigricantibus. Thorax compressus, ferrugineus, immaculatus nodo unico. Abdomen glabrum, atrum, immaculatum. Pedes ferruginei, postici elongati tibiis fuscis.

- pallipes.* 28. F. atra nitida antennis pedibusque albidis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parva. Caput parvum, rotundatum antennis albis. Thorax gibbus, ater, nitidus. Squama petiolaris truncata, sere emarginata. Abdo-

men ovatum, atrum, nitidum. Pedes albi.

Alae albae.

29. F. nigra thorace rufo postice bidentato, petiolo *aegyptiaca*.
binodi.

Habitat in Aegypto Prof. Forskahl.

Parva. Caput magnum, fulcum antennis ferrugineis. Thorax compressus, fulcūs, postice bidentatus. Abdomen fuscum. Pedes ferruginei femoribus subclavatis.

30. F. testacea abdomine apice nigro, petiolo binodi. *antiguensis*.
Habitat in Antigua Insula Mus. Dom. Banks.

Parva, testacea abdomine apice solo nigro.

31. F. ferruginea abdōmine atro, pedibus flavescens *guineensis*.
tibus.

Habitat in Guinea Dr. Isert.

Minuta, ferruginea. Caput obscurius rufescens.

Abdomen atrum pedibus pallidioribus.

32. F. nigra capite maximo rufo, petiolo binodi. *binodis*.

Habitat in Aegypto Prof. Forskahl.

Mēdia. Caput abdōmine majus, rufum, immaculatum. Thorax compressus, angustissimus, niger. Petiolus nodis duobus? anticē majori. Abdomen parvum, subrotundum, nigrum. Pedes rufi femoribus ferrugineis.

33. F. thorace punctis elevatis, petiolo binodi, cor omnivora.
pore testaceo, abdōmine minuto.

Formica omnivora. Linn. Syst. nat. 2. 964. 12.

Formica pusilla rufa abdōmine fusco, pedibus testacels, thorace bidentato. Degeer Ins. 3.
611. 9. tab. 31. fig. 23. 24.

Habitat Surinami.

34. F. flava abdōmine ovato pubescente. *flava*.

Formica flava squamā petiolari. Degeer Ins. 2.

2. 326. 5. tab. 42. fig. 24-28.

Habitat in Europae borealis sylvis.

Parva magnitudine tamen differt.

caespitum. 35. F. nigra abdominis petiolo binodi, scutello bidentato.

Formica *caespitum* abdominalis petiolo binodi: priore subtus thoraceque supra bidentato. Linn.
Syst. nat. 2. 963. 11. Fn. Sv. 1726.

Formica *binodis*. Linn. Amoen. acad. 6. 413. 94.

Formica *ferruginea* capite abdominalisque aculeatis, rufis, thorace bispinoso. Degeer Ins. 2. 2. 334. 7. tab. 43. fig. 21. 22.

Act. Berol. 5.

Hamb. Magaz. 5. 393.

Sulz. Hist. Ins. tab. 17. fig. 20. 21. 22.

Act. Hafn. 10. 1. tab. 1. fig. 1. 2. 3.

Habitat in Europae borealis pratis siccioribus sub muscis. Mares foeminaeque examinant medio Augusti, meridie calido, more Phryganorum in aere choreas agentes, turma volantili, depluentes per paria juncta. Linn.

suberum. 36. F. rufa capite abdominalisque fascia nigris, petiolo binodi.

Habitat in Sueciae pratis.

Praecedente minor. Antennae rufae, apice nigrae. Thorax ferrugineus, postice bidentatus.

vagans. 37. F. rufa capite abdominalisque dorso fuscis, thorace postice bispinoso, petiolo binodi.

Habitat in Saxonie Dr. Heisse.

Statura omnino F. tuberum at duplo fere major.

Caput globosum, supra fuscum. Antennae ferrugineae. Thorax compressus, rufus, postice bispinosus. Abdomen ovatum, rufum dorso fuso. Pedes rufi.

aceruorum. 38. F. rufa capite abdominalisque nigris, thorace postice bispinoso, petiolo binodi.

Habitat in Danice nēmoribus Mus: Dom. de Sehestedt.

Nimis certe affinis F. tuberum. Caput nigrum antennis mandibulisque rufis. Thorax rufus dorso nigro postice spinis duabus porrectis, validis, acutis. Petiolus ferrugineus, binodis. Abdomen glabrum, atrum, immaculatum. Pedes ferruginei.

39. F. nigra antennis pedibusque rufis, squama petiolari unispinosa, mandibulis porrectis parallelis.

Habitat in Guadeloupe Insula Dom, de Badier.

Corpus elongatum. Caput magnum, nigrum antice canaliculatum mandibulis porrectis, parallelis. Antennae rufescentes. Thorax compressus, niger, immaculatus. Squama petiolaris ovata terminatur spina acuta, valida. Abdomen ovatum, nigrum. Pedes rubri.

40. F. nigricans thorace sub scutello bidentato, ab domine magno globoso.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Magna. Antennae piceae, apice cinerascentes. Caput piceum, postice utrinque subspinosum. Thorax magnus, gibbus, niger, sub scutello spinosus. Abdomen magnum, globosum, nigrum, immaculatum petiolo brevissimo. Alae ferrugineae. Pedes picei.

41. F. nigra thorace inermi, squama petiolari bispinosa.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Corpus medium, totum nigrum tomento cinereo subnitente. Squama petiolaris crassa, obtusa spinis duabus incurvis, validis.

- bidens.* 42. F. thoracis gibbere bidentato, capite ovato, antennis ferrugineis: articulo primo nigro.
Linn. Syst. nat. 2. 964. 13.
Formica rufo fusca antennis ferrugineis articulo infimo nigro, capite ovato, thoracis gibbere bidentato, petioli squama erecta. Degeer Ins. 3. 601. 1. tab. 31. fig. 1:2.
Habitat Surinami.
- biscutata.* 43. F. thorace bidentato, squama petiolari duplicata.
Habitat Cajennae Dr. Mallet.
Caput piceum, postice utrinque acuminatum.
Thorax elevatus, gibbus, postice bidentatus.
Petiolus squamis duabus, brevibus, ovatis.
Abdomen globosum, piceum linea dorsali, nigra. Alae subferrugineae.
- clavata.* 44. P. nigra thorace bidentato, abdominis petiolo subtus unidentato.
Habitat in India.
Corpus magnum, nigrum oculis testaceis. Caput thorace latius mandibulis concavis, validis. Thorax gibbus, medio bidentatus. Petiolus nodo elevato, gibbo & sub hoc nodo dens acutus, validus. Abdomen ovatum primo segmento globo.
- attelaboides* 45. F. thorace bispinoso nigra pedibus ferrugineis, capite postice attenuato.
Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.
Magna. Caput scabrum, nigrum, immaculatum, postice attenuatum. Thorax tenuis, niger, postice ferrugineus spinis duabus approximatis, validis, incurvis, Squama petiolaris ovata. Abdomen fuscum, pubescens. Pedes ferruginei.
- arenaria.* 46. F. thorace postice impresso bispinoso atra planitis piceis.

Habitat in Barbariae arena mobili Dom. Prof.
Vahl.

Magna. Caput grande, ovatum, laeve, atrum.
Thorax compressus, niger, postice impressus
spinis duabus validis. Petiolus binodis. Abdo-
men subglobosum, pubescens. Pedes nigri plan-
tis solis piceis.

47. F. thorace postice bispinoso ferrugineo, abdo- *megacepha-*
la.
mine nigro, capite maximo.

Habitat in Isle de France Mus. Dom. Bosc.

Parva. Caput ovatum, maximum, toto corpore
majus, ferrugineum margine antico parum
nigricante. Mandibulae breves, crassae. An-
tennae ferrugineae. Thorax tenuis, ferrugi-
neus postice spinis duabus brevibus, acutis.
Petiolus binodis, ferrugineus. Abdomen ova-
tum, nigrum. Pedes ferruginei.

48. F. thorace bispinoso, squama petiolari spinis *Ammon.*
duabus incurvis.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Caput parvum, ovatum, inerme, nigrum.
Thorax compressus, submarginatus, niger
dorso tomento aureo, nitente, postice spinis
duabus rectis, validis. Squama petiolaris ovata,
truncata spinis duabus valde incurvis. Abdo-
men subrotundum, nigrum tomento aureo vil-
losum. Pedes nigri.

49. F. thorace quadrispinoso squama petiolari spinis *bihamata.*
duabus arcuatis.

Formica bihamata. Drury Ins. 2. tab. 38. fig.

7. 8.

Sulz. Hist. Ins. tab. 27. fig. 19.

Habitat in Insula St. Johannis Indiae.

Caput parvum, subrotundum, inerme antennis
fere longitudine corporis. Thorax compressus,

ferrugineus antice utrinque spinas porrecta, elongata, arcuata, in medio spinae duas recurvae, acutissimae, postice tubercula duo fere obsoleta. Squama petiolaris porrecta, basi cylindrica, ferruginea, ultra medium fissa in spinas duas arcuatās, nigras. Abdomen subglobosum, nigrum, basi ferrugineum. Pedes elongati, nigri femoribus ferrugineis.

militaris. 50. F. thorace antice bispinoso, squama petiolaris quadrispinosa.

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. D. Banks.

Magna. Caput magnum, gibbum, nigrum inter antennas utrinque carinatum. Thorax gibbus, fuscus antice utrinque spina acuta, valida. Squama petiolaris spinis quatuor erectis, validis: lateralibus paullo minoribus. Abdomen globosum, pubescens, nigrum. Alae fuscae.

4 dens. 51. F. thorace quadridentato atra capite bicarinato. Habitat Cajennae Mus. Dom. Bosc.

Media. Caput ovatum, atrum carina duplice abbreviata. Mandibulae breves, crassae; fornicatae. Thorax ater denticulis duobus antice duobusque postice elevatis, brevibus, acutis. Squama petiolaris ovata, crassa, obtusa. Abdomen ovatum, atrum. Pedes nigri.

cephalotes. 52. F. thorace quadrispinosa, capite didymo magno utrinque postice mucronata. Linn. Syst. nat. 2. 964. 15.

Formica migratoria. Degeer Ins. 3. 604. 5. tab. 31. fig. 11.

Margr. Bras. 252.

Merian. Surinam tab. 18. fig. majores.

Seb. Mus. 4. tab. 99. fig. 6.

Habitat in America meridionali.

53. F. thorace sexspinoso, capite didymo maximo. 6 *dens.*

Linn. Syst. nat. 2. 964. 14.

Formica rufa capite didymo magno utrinque postice spinoso, thorace sexspinoso. Degeer Inf. 3. 608. 6. tab. 37. fig. 14.

Habitat in America meridionali.

Affinis certe F. cephalotes & forte mera ejus varietas.

54. F. thorace quadrispinoso, capite depresso marginato utrinque bispinoso. Linn. Syst. nat. 3. 965. 16.

Formica quadridens atra nitida capite magno depresso marginato, utrinque bispinoso, thorace quadrispinoso. Degeer Inf. 3. 609. 7. tab. 31. fig. 17.

Seb. Mus. 4. tab. 99. fig. 7.

Habitat in America meridionali.

55. F. rufa abdome apice nigro: primo segmento *gulosa*. contracto, mandibulis porrectis.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Magna. Caput ovatum, rufum mandibulis porrectis longitudine capitidis, dentatis, pallidis. Thorax inermis, medio compressus, rufus. Petiolus abdominis elongatus tuberculo magno, subrotundo. Abdomen rufum, nitidum, apice atrum: primo segmento brevi, contracto, campaniformi. Pedes rufi.

56. F. fusca abdome pubescente nigro: primo *forficata*. segmento contracto, mandibulis porrectis.

Habitat in terra Diemenii Mus. Dom. Banks.

Magnitudo & summa affinitas F. gulosae. Caput magnum, planum, ferrugineo fuscum mandibulis longitudine capitidis forficatis, intus dentatis. Antennae fuscae. Thorax tenuis, in medio compressus, fuscus. Petiolus nodo

- magnō, globoso. Abdominis segmentum p̄fīmū contractū, reliquī multo angustiū, reliqua pubescentia, nigra. Pedes obscure ferruginei.
- rostrata.* 57. F. thorace compresso antice tridentato, mandibulis porrectis incurvis.
 Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
 Parva. Caput nigrum mandibulis porrectis, validis, incurvis. Thorax compressus; antice elevatus. Squama petiolaris ovata. Abdomen ovatum, pubescens, nigrum. Pedes nigri.
- hamata.* 58. F. ferruginea capite maximō pallido, mandibulis porrectis hamatis.
 Habitat Cajennae Mus. Dom. Yeats.
 Media. Caput maximum, subrotundum, pallidum, nitidum basi utrinque spina parva, conica. Mandibulae porrectae, capite longiores, basi tenuiores, apice hamatae, acutae, nigrae, basi ferrugineae. Corpus ferrugineum thorace inerini petioloque binodi.
- haematoda.* 59. F. squama petiolarī conicā acutissimā, capite subdidymo, mandibulis porrectis. Linn. Syst. nat. 2. 965. 17.
 Formica maxillosa alata, nigro fusca pedibus maxillisque porrectis rufis, squama petiolarī conica. Degeer Inf. 3. 601. 2. tab. 31. fig. 3.
 Habitat in America meridionali.
- Oblonga. Mandibulae porrectae, edentulae, obscure rufae. Caput rufescens oculis orbiculatis, atris. Thorax inermis, niger. Alae hyalinae.
- maxillosa.* 60. F. thorace sexdentato, capite flavescente: mandibulis longitudine capitis.
 Habitat in India Mus. Hagense.

Caput maximum, flavescens oculis nigris mandibulisque porrectis, parallelis longitudine capitis. Thorax spinis sex anticis duabus validis, intermediis tenuioribus, recurvis, posticis brevissimis. Abdomen subrotundum fuscum.

162. DORYLUS. *Os palpis maxillisque absque lingua.*

Palpi inaequales, brevissimi.

Maxilla brevissima, cylindrica.

Antennae filiformes.

1. *Dorylus.*

heluolus.

Mutilla heluola abdome cylindrico apice pubescente, femoribus compressis. Mant. Inf. 2.

313. 18.

Mutilla heluola. Linn. Syst. nat. 2. 967. 8.

Vespa heluola. Linn. Mus. Lud. Ulr. 412.

Habitat ad Cap. Bon. spei.

Genus singulare instrumentis cibariis, mandibulis exceptis, minutissimis, attamen distinctis. Tiphiae proximum.

Os palpis maxillisque absque lingua.. Palpi quatuor brevissimi, inaequales, filiformes, anteriores paullo longiores, quadriarticulati: articulis globosis, aequalibus adnati maxillae sub apice, posteriores paullo breviores, triarticulati: articulis aequalibus adhaerentes labii medio. Mandibula magna, exserta, cornea, incurva, basi parum dilatata, acuta, omnino integra. Maxilla brevissima, cornea, cylindrica, obtusa, integerrima. Labium breve, corneum,

inter palpos rotundatum, integerrimum. Antennae filiformes, articulo primo globoso, secundo longissimo, cylindrico.

Corpus majuscum, hirtum, heluolum mandibulis pedibusque compressis ferrugineis. Oculi prominuli, globosi, atri stemmataque tria capitis alba. Abdomen cylindricum, sessile, minus hirtum, primo segmento distincto. Alae obscurae.

163. MUTILLA. *Palpi* quatuor: articulis obconicis.

Labium porrectum cornuum, obconicum, apice palpigerum.

Antennae filiformes.

coccinea. I. M. coccinea ab domine cingulo nigro. Linn. Syst. nat. 2. 966. 1.

Petiver. Gazoph. tab. 13. fig. 10.

Petiver. Filic. 404. tab. 11. fig. 4.

Catesb. Carol. 4. 15. tab. 15.

Sulz. Inf. tab. 19. fig. 9.

Habitat in America septentrionali.

Saepius aptera, rarius alata alis atris. Aculeus reconditus, punctarius.

Mutillae corpus oblongum, tomentosum, immarginatum, agile, capite parvo, exerto, rotundato, declivi, oculis parvis, rotundatis, prominulis, lateralibus, antennis breviusculis, flexuosis, approximatis, medio frontis insertis, thorace ovato, scutello vix conspicuo, ab domine sessili, conico, aculeo recondito, obsoleto, alis quatuor inaequalibus, saepius nullis, pedibus brevibus, validis, tarsis quinquearticulatis, colore vario.

2. *M. coccinea abdominis apice nigro: strigis albis. antiguenfis.*
 Habitat in Insula Antigua.
Praecedente dimidio minor. Caput coccineum oculis nigris. Thorax coccineus, immaculatus. Abdomen ovatum, coccineum macula parva baseos nigra. Apex niger strigis tribus albis subobsoletis. Pedes nigri.
3. *M. thorace subspinoso varioloso piceo, abdomine guineenfis. atro: punctis duobus fasciaque interrupta albis.*
 Habitat in Guinea Dr. Ifert.
Magna. Caput punctatum, atrum, immaculatum. Thorax subvillosum utrinque spinulis aliquot fere obsoletis punctisque latis impressis, piceus, immaculatus. Abdomen villosum, atrum punctis duobus fasciaque postica, interrupta albis. Pedes nigri.
4. *M. atra abdomine punctis duobus baseos striga diadema. media interrupta flavis lineolaque apicis alba.*
 Habitat Surinami Dom. Hybner.
Magna. Caput atrum fascia baseos alba. Thorax ater lineolis duabus ad scutellum subtusque lateribus albis. Abdomen atrum primo segmento breve utrinque lineola alba, secundo maximo puncto utrinque baseos strigaque media interrupta elevatis, flavis, reliquis lineola media usque ad apicem alba. Subtus atrum linea baseos laterali segmentorumque trium marginibus albis. Pedes atri.
5. *M. atra abdomine maculis quatuor flavescensibus americana.*
lineisque tribus albis. Linn. Syst. nat. 2. 966. 2. Sphex americana aptera nigra abdomine maculis rufis quatuor lineisque tribus albis. Degeer Ins. 3. 591. 8. tab. 30. fig. 10.
 Habitat in America australi.