

Forel 8. CLXVII hat ferner noch die var. *alieno-niger* For. von Creta, eine auf dieser Insel endemische Form.

42.* *Myrmecocystus cursor* (Fonsc.).

1886 Forel 9. CLXVII

1894 Emery 5. 10

1896 Cecconi 4. 33.

Sonst in Südeuropa und Vorderasien zerstreut.

43.* *Myrmecocystus viaticus* (F.).

1888 Forel 11. 256

1896 Cecconi 4. 34.

Ausser über Griechenland und den griechischen und kleinasiatischen Archipel über Nordafrika bis südwärts nach Abessinien und über Vorder- und Mittelasien bis hinab nach Nordindien verbreitet.

44.* *Camponotus vagus* (Scop.).

1854 H. Lucas 23. (VI) 491 (*Formica pubescens*)

1869 Raulin 26. 1017 (Umgegend von Candia [Megalokastron], *Formica pubescens*)

1896 Cecconi 4. 34 (*Camponotus pubescens*).

In Europa weitverbreitet und häufig. Cecconi glaubt jedoch, dass das Vorkommen dieser Art auf Creta noch neuerlicher Bestätigung bedürfe.

45.* *Camponotus maculatus* (F.) subsp. *cognatus* (F. Sm.) var. *maculato-dichrous* For.

1888 Forel 11. 255

1896 Cecconi 4. 34 (C. m. subsp. *dichrous* v. m.-d.).

Forel verzeichnete diese „Varietät“ ausser von Creta nur noch von der Insel Rhodus. Die Unterart *cognatus* (F. Sm.) besitzt jedoch eine weite Ausbreitung über den griechischen Archipel, Nordafrika, Vorder- und Südasien.

Camponotus maculatus (F.) subsp. *silvaticus* (Oliv.).

1886 Forel 8. CLXVII (C. *sylvaticus* i. sp.).

Sonstige bekannte Verbreitung: weite Strecken Südeuropas und Turkestan.

Camponotus maculatus (F.) subsp. *aethiops* (Latr.).

1886 Forel 8. CLXVII (C. *sylvaticus* stirps a.)

1896 Cecconi 4. 34.

Camponotus maculatus (F.) subsp. *aethiops* (Latr.) var. *concavus* For.

1894 Emery 5. 8

1896 Cecconi 4. 33.