

ALBERTO CARNIEL

CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLA MIRMECOFAUNA
DEL CANSIGLIO (PREALPI CARNICHE)

(Hymenoptera)

Sono stati raccolti Imenotteri Formicidi negli anni 1978 - 1984 nel Pian del Cansiglio (Prealpi Carniche) e nelle zone circostanti.

Tutti gli esemplari delle specie citate sono stati ottenuti per cattura diretta sul terreno, e si trovano nelle collezioni dell'Istituto di Entomologia agraria dell'Università di Padova; in buona parte essi sono stati determinati dal dott. Bruno Poldi di Mantova, al quale esprimo viva riconoscenza.

I dati citati a seguito di ciascuna specie indicano, per ciascun esemplare:

- il numero con cui esso è contrassegnato;
- il luogo di raccolta desunto dalla tavoletta topografica F.23 II S.E. Bosco del Cansiglio, edita dall'Istituto Geografico Militare;
- l'ubicazione secondo le coordinate del reticolo UTM internazionale, con una approssimazione al quadrato di 100 m di lato;
- l'altitudine;
- il sesso e la casta degli esemplari catturati;
- la data di raccolta.

L'ordine seguito nell'elencazione delle singole specie è quello proposto da BARONI URBANI nel « Catalogo delle specie di Formicidae d'Italia » (1971).

Sottofamiglia MYRMICINAE

Manica rubida (Latreille)

20 Foresta del Cansiglio, UM 008 047, m 1014, ♀ ♀, 6.VIII.82
24 Foresta del Cansiglio, UM 006 044, m 1025, ♀ ♀ ♀ ♀ ♂ ♂, 9.IX.82
60 Candaglia, UM 024 045, m 1268, ♀ ♀, 19.VII.84
66 Costa Campo di Sopra, TM 967 022, m 1312, ♀, 26.VI.84
margini prateria - pecceta, prateria - faggeta.

Tre colonie, nella fascia di margine tra prateria e foresta. Il nido della prima era scavato nel suolo e rivelato solo dal foro d'ingresso circondato da un piccolo anello di terra smossa; quelli della seconda e della terza si trovavano in spaziose fenditure di rocce.

La femmina feconda, dealata, è stata raccolta lungo il ciglio della strada, sulle opere di sponda.