

Ho raccolto le operaie di ambedue i campioni mentre deambulavano su rocce, senza riuscire però ad individuare l'ubicazione delle colonie, probabilmente situate sotto le rocce stesse, luogo di nidificazione abbastanza frequente per questa specie (BONDROIT, 1918; BERNARD, 1957, 1968).

*Leptothorax nigriceps* Mayr

46 Foresta del Cansiglio, UM 006 044, m 1025, ♂♂, 24.IX.83  
 47 Pian Cansiglio, UM 003 049, m 1004, ♀, 24.IX.83  
 48 Pian Cansiglio, UM 002 049, m 1004, ♀♀, 24.IX.83  
 51 Pian Cansiglio, UM 002 048, m 1007, ♀♀♀, 26.VI.84  
 62 Candaglia, UM 024 045, m 1268, ♀, 19.VII.84  
 margine prateria - pecceta.

Gli esemplari delle prime due colonie sono stati raccolti su rocce (formicaio non individuato); quelli della terza e quarta colonia avevano dimora nelle strette fessure di grossi massi. La femmina feconda era posata sulla stessa roccia su cui ho raccolto gli esemplari di *Leptothorax acervorum* della colonia 61.

*Leptothorax unifasciatus* (Latreille)

65 Valsalega, TL 979 996, m 790, ♂♂ ♀♀, 12.VIII.84  
 margine pecceta.

Ho rinvenuto la colonia tra le fessure della roccia costituente il muro di sponda della strada statale; anche operaie di *Tapinoma erraticum*, *Plagiolepis pygmaea* e *Lasius emarginatus* frequentavano lo stesso substrato, senza apparenti interrelazioni tra individui di specie diversa.

*Tetramorium caespitum* (Linnaeus)

1 Pian Cansiglio, UM 001 048, m 1004, ♂♂, 6.VII.82  
 34 Pian Cansiglio, UM 001 048, m 1004, ♂♂ ♂♂, 5.VII.83  
 prateria.

Colonie nidificanti in monticelli di terra ricoperti da vegetazione erbacea. Gruppi di maschi pronti per il volo sono stati ottenuti per scavo di un formicaio.

Sottofamiglia DOLICODERINAE

*Tapinoma erraticum* (Latreille)

50 Ponte Val dell'Ors, TM 988 029, m 1052, ♂, 26.VI.84  
 57 Valsalega, TL 979 996, m 790, ♀♀, 14.VII.84  
 margine pecceta.

Sottofamiglia FORMICINAE

*Plagiolepis pygmaea* (Latreille)

54 Valsalega, TL 979 996, m 790, ♀♀, 26.VI.84  
 margine pecceta.