

em *Formica*. Pilosidade ereta quase nula; pubescência sedosa forte e generalizada.

Pupas. Envolvidas em casulo amarelo sujo.

Larvas (segundo Wheeler & Wheeler, 1953: 170). Com 7-8 somitos distintos. Tórax formando "pescoço" grosso curvado em sentido ventral. Abdômen reto, inchado, subcilíndrico, sem "presépio" das larvas de *Camponotus*. Pilosidade abundante, generalizada, de três tipos; a) pêlos simples, delgados e mais ou menos flageliformes; b) pêlos ramificados em 2-4 ramos; c) pêlos mais grossos e duros, um pouco curvados e denticulados. Crânio elíptico em sentido transversal com as bochechas intumecidas e salientes; tegumento esparsamente espinuloso; pêlos da cabeça dos tipos a e c. Labro com sulco sagital na face anterior, bilobado. Mandíbulas fortemente esclerosadas. Palpos maxilares digitiformes. Palpos labiais em forma de pinos curtos e enviesados. Verificamos êstes caracteres nas larvas colhidas pelo autor Júnior em Utáriti, MT.

Ovos. Amarelo claros, elípticos, oblongos, com pouco mais de 1 mm de comprimento.




Fig. 1: *Gigantiops destructor* (F., 1804), operária.

***Gigantiops destructor* (Fabricius, 1804)**

(Figs. 1-12)

Formica destructor Fabricius, 1804: 402 (operária; América do Sul);

Mayr, 1863: 414; Roger, 1862: 287 (sinonímia).

Gigantiops destructor; Roger, 1863: 11; Forel, 1879: 126-7 (operária; Guiana Francêsa: Cayenne); Mayr, 1883: 31 (Guiana Francêsa: Cayenne); Mayr, 1886: 356 (sinonímia); Dalla Torre, 1893: 175;