

margen occipital, por lo menos por su espesor apical. Funiculo con el art. 1º casi tan largo como los dos siguientes juntos; art. 2-3 casi iguales; el último tan largo como los dos anteriores juntos.

Palpos maxilares cortos, de 6 artículos, alcanzan apenas el orificio occipital; el 1º artículo es más corto, los otros 5 igualmente largos. Palpos labiales aun mucho más cortos, de 4 artículos subiguales. (Generalmente los palpos son iguales en las tres formas).

Perfil del tórax muy aplanado; mesonoto y escutelo casi horizontales; suturas muy distintas. Epinoto visto de perfil forma un arco regular.

Escama biconvexa; margen superior un poco escotado.

*Macho.* — Largo 7-7,5 mm. Color uniforme negro. Sin escultura. Liso y lustroso. Pubescencia más fina y más rala que en la hembra, siendo relativamente más abundante solamente sobre las patas.

Cabeza trapezoidal; detrás de los ojos casi dos veces más ancha que en su margen anterior. Margen occipital casi derecho. Ojos muy grandes, ocupan más o menos la mitad de los costados. Ocelos casi dos veces más grandes que en la hembra. Clípeo convexo con el margen anterior redondeado. Mandíbulas de tamaño reducido y de conformación normal, tienen 5 dientes pequeños.

Palpos maxilares y labiales como en la hembra.

Aristas frontales cortas; espacio entre ellas con una carena longitudinal poco marcada. Escapos casi derechos; sobrepasan el margen occipital de la cabeza por, aproximadamente, 1/3 de su largo, son tan largos como los artículos funiculares 1-5 juntos; funículos filiformes, con el artículo 1º más corto, art. 2-11 casi iguales y art. 12 es 1 ½ veces más largo que el precedente.

La conformación del tórax es muy particular.

Protórax es relativamente reducido y en su parte anterior representa una cinta vertical que corre en el sentido transversal. Pronoto no está desarrollado completamente. Mesonoto casi horizontal, elevado sobre el protórax, con dos suturas laterales longitudinales que no alcanzan su margen anterior, y una sutura transversal que la separa del escutelo. Escutelo muy convexo, particularmente en su parte posterior. Epinoto convexo, redondeado, con los espiráculos bien distintos.

Escama más gruesa que en la hembra con el margen superior obtuso de perfil y casi no escotado.

Las alas del macho y de la hembra son iguales y tienen la nervadura similar con una celda discoidal, una celda cubital y una celda radial cerrada.