

b) Von der Höhenlage

Die meisten Arten treten zwischen 200 und 400 m Höhe in den südlichen Ebenen auf (Südmuntenia, Südoltenia, Südwestbanat, Westtransilvania, Crisana und Dobrogea). Die Artenzahl vermindert sich gegen die Karpaten (Buccgi, Fagaras, Paring, Retezat, Semenice, Tazlau) und nach Norden zum Rodneigebirge hin (Abb.2).




Abb. 2

Abb.2 Verbreitung der Ameisenarten in Abhängigkeit von der Höhenlage.

Anhand einiger Schnittlinien durch Rumänien, läßt sich die Häufigkeit der Ameisenarten in Abhängigkeit von Relief, Bodenzustand und Pflanzenbewuchs erkennen (Abb.3).

Höhenlage	Ameisenarten, durch Nummern verschlüsselt (vgl. Tab. 1)
0-200m	1-6; 15-22; 24-26; 28; 31-35; 38-47; 49-52; 54-75.
200-400m	3-16; 21-28; 30; 32-34; 36-42; 44-47; 49-56; 58-65; 67-75.
400-600m	3; 6; 8; 9; 10; 15; 21-23; 25-26; 28; 32-33; 40; 42; 46-58; 61-63; 65-67; 75.
600-800m	3; 6; 8; 9; 10; 15; 21-22; 25-26; 28; 32-33; 40; 42; 46-58; 61-63; 65; 67-75.
800-1000m	6; 10; 12-13; 23-24; 29; 33; 40; 47-49; 53-56; 61-63; 68-69; 72-75.
1000-1200m	6; 12; 13; 23; 29; 33; 47-49; 53-56; 61-62; 68-69; 75.
1200-1400m	6; 12-13; 23; 29; 33; 47; 53; 55-56; 61; 62; 68; 69; 75.
1400-1600m	9-13; 21; 23; 29; 33; 47; 56; 58; 61-62; 68-69; 75.
1600-1800m	12-13; 23; 29; 33; 47; 61-62.
1800-2000m	12-13; 23; 47; 61-62.
2000-2200m	12-13; 33; 61-62.
2200-2400m	12-13; 33; 61-62.