

MAURIZIO MEI (°)

NUOVI REPERTI DI FORMICIDI PER L'ITALIA CENTRALE  
(Hymenoptera, Formicidae)

Le attuali conoscenze sulla mirmecofauna italiana presentano ancora vaste lacune: intere regioni, soprattutto al centro e al sud della penisola, sono state poco o male studiate. Nel corso delle mie ricerche mirmecologiche nell'Italia centrale, ho avuto occasione di raccogliere un certo numero di specie non ancora segnalate per le regioni Toscana, Lazio e Abruzzo. Nel presente lavoro sono riuniti alcuni dati faunistici, morfologici e biologici relativi ad alcune di queste.

Tranne casi particolari, non ho ritenuto necessario, per non appesantire troppo il testo, fornire dettagliate indicazioni sulla distribuzione generale dei singoli taxa trattati; per queste si potrà utilmente consultare il catalogo delle formiche d'Italia (Baroni Urbani, 1971). Tutti gli esemplari oggetto di questa nota sono stati raccolti da me stesso. Il dr. Baroni Urbani (Basel) ha voluto gentilmente comunicarmi di aver a suo tempo raccolto, (ma non pubblicato), sul massiccio del Gran Sasso e sul Terminillo, alcune delle specie qui segnalate: per queste, le suddette località di raccolta vengono riportate in aggiunta alle mie.

Subfam. Ponerinae

**Hypoponera eduardi** (Forel, 1894)

Lazio: Roma, Villa Borghese, XI.1982, ♀♀ alate e dealate, ♂♂, operaie.

Specie mediterraneo-atlantica, a costumi ipogei. L'ho raccolta nella terra e sotto le cortecce alla base di ceppi marcescenti.

Subfam. Myrmicinae

**Myrmica rubra** (Linné, 1758)

(= *M. laevinodis* Nylander, 1846)

Lazio: rive del fiume Aniene tra Vicovaro e Mandela (Roma), 23.V.1982, operaie.

Specie paleartica altamente igrofila che nidifica quasi esclusivamente sui greti dei fiumi e dei torrenti (Baroni Urbani, 1971). Molto aggressiva; la sua puntura è dolorosa anche per l'uomo. Per quanto mi risulta, questa è la segnalazione più meridionale di questa specie in Italia.

(°) Via Flavia, 77 - 00187 Roma