

Un sillon lisse réunit l'ocelle impair au sommet de l'aire frontale qui est un peu ridée. Sur le vertex, des rides sinueuses, anastomosées en mailles irrégulières se superposent à la réticulation.

Thorax robuste, 1,6 fois plus long que large. Épaules marquées mais arrondies. Profil du dos en courbe convexe, tombant presque verticalement devant; mésonotum ne surplombant pas le pronotum, mais se raccordant graduellement à lui (comme chez la femelle).

Scutum bombé, sillons antérieurs marqués, les latéraux moins. Densément réticulé, les rides longitudinales, anastomosées en mailles irrégulières, sont fortes en arrière, s'effacent vers l'avant.

Scutellum saillant, ridé-réticulé, séparé du précédent par un large sillon. De longues soies courbes, espacées, le garnissent surtout sur les bords.

Métanotum en bourrelet très mince, portant aussi des soies comme celles du scutellum.

Face dorsale de l'épinotum plus longue que la déclive; elles font un angle de 130°. Deux petites dents triangulaires, guère plus hautes que larges. Faiblement ridé en long sur les côtés, seulement réticulé entre les épines.

Flans du thorax peu ridés, mais toujours réticulés.

Ailes un peu plus courtes que le corps; nervures très pâles, presque invisibles, stigma brun clair. Radiale subfermée, petite, incurvée. Cubitale longue, rectangulaire; discoïdale pentagonale, petite, parfois incomplète.

Pattes assez robustes, moyennes, les postérieures un peu plus petites que le corps. Pilosité fine et courte.

Pétiole allongé, bas, 1,6 fois plus long que large de profil. Nœud globuleux, peu élevé, aussi long que le pédicule. Sculpture en mailles, effacée dessus, plus nette sur les côtés.

Postpétiole globuleux, plus large que long. Même ornementation.

Gastre un peu plus court et étroit que le corselet, en forme d'olive. Lisse et luisant, garni de soies longues, pointues, blanchâtres, assez souples et nombreuses.

Ce mâle est très voisin de celui de *L. rottenbergi* EM. (Italie méridionale), dont il diffère par les proportions des articles antennaires et la présence de dents épinotales.

Genitalia du mâle.

Pièces génitales bien développées, rétractiles.

Plaque sous-génitale triangulaire, son sommet presque pointu. Une quarantaine de soies jaunes. Pas d'épaississement basal. Brune.

Squamula et stipe bien soudés, formant un ensemble 2 fois plus long que large, triangulaire et sinué. Le côté ventral est droit, avec une petite encoche allongée peu profonde. Le côté dorsal fait une courbe. Sommet arrondi, incurvé en dedans et portant une cinquantaine de soies jaunes. Brun clair, sommet assombri.