

réticulation de base, et luisant. Pilosité rare, de longueur variable, un peu plus abondante sur le gastre et l'avant de la tête.

Mandibules pratiquement unidentées. Dent apicale forte et aiguë; préapicale nulle ou à peine indiquée. Bord masticateur droit. Angle basal peu arrondi et obtus.

Palpes maxillaires de 6 articles. Le premier court, le 2<sup>e</sup> et le 3<sup>e</sup>, 2,5 fois plus long que le premier; le 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> un peu plus petits que les précédents (2 fois le premier), le dernier encore plus court, à peine plus allongé (1,3 fois le premier).

Tête 1,25 fois plus longue que large, nettement rétrécie en avant. Bord occipital largement arrondi, sans angles. Bord postérieur 1,3 fois plus étroit que la largeur en arrière des yeux.

Épistome bombé et caréné. Son bord antérieur forme un angle saillant très obtus. Son bord postérieur est séparé du reste de la tête par une nette dépression linéaire.

Yeux moyens (leur grand diamètre un peu supérieur au tiers de la longueur de la tête), saillants, noirs, situés au milieu des côtés de la tête.

Ocelles moyens, bien écartés, la distance entre l'antérieur et un des postérieurs égale 2 fois leur diamètre.

Front surélevé, bordé de deux dépressions latérales prolongeant les fossettes antennaires.

Scape long, dépassant l'occiput de la moitié de sa longueur. Premier article du funicule renflé, 2 fois plus long que large au sommet. Le 2<sup>e</sup> à peu près cylindrique, 1,2 fois plus grand que lui et 4 fois plus long que large. Le 3<sup>e</sup> comme le 2<sup>e</sup> et comme le dernier. Les 5<sup>e</sup> à 12<sup>e</sup> articles antennaires de plus en plus larges et de plus en plus courts, si bien que le pénultième est à peine 1,3 fois plus long qu'épais.

Thorax plus bombé en avant que chez la femelle. 2,3 fois plus long que large, aplati dessus.

Épaules très arrondies.

Scutum vertical et convexe devant, plat en arrière. Sillons antérieurs (divergents) et sillons latéraux bien marqués.

Scutellum plat dessus, se reliant au métanotum par une pente doucement arrondie, oblique. Un net et large sillon le sépare du scutum

Métanotum en bourrelet, séparé du précédent et du suivant par de nets sillons.

Épinotum bien moins bombé que chez la femelle, un peu convexe et tombant presque verticalement.

Ailes moyennes, un peu plus courtes que le corps, à nervures et stigma brun clair. Radiale fermée et allongée; cubitale basse et trapézoïdale. Pas de discoïdale comme chez tous les *Camponotus*.

Pattes moyennes, les postérieures guère plus longues que le corps. Pas d'épine sur le bord interne des tibias.

Nœud du pétiole presque cubique de profil, 2 fois plus large que long de dessus.