

Formicides du Musée de Dundo (Angola)

(*Hymenoptera, Formicidae*)

Il nous a été possible, grâce à l'extrême obligeance du Dr. A. DE BARROS MACHADO, Laboratório de Biologia do Museu do Dundo, d'étudier quelques Dorylines et Ponérines de l'Angola.

DORYLINAE

I. Sous-genre *Dorylus* Fabricius

1. *Dorylus affinis* Shuckard

ANG. 12 480.2: des ouvrières maior, media, minor et minima, des larves et des nymphes. Camissombo (Lunda Nord-Est), dans l'estomac d'un Oryctérope. 23/XI/1957, Dr. F. REAL leg.

Cet échantillon a manifestement été mangé pendant un exode, il comporte en effet beaucoup de larves et de nymphes non arrivées à maturité.

2. *Dorylus braunsi* Emery

ANG. 4 786: des ouvrières maior, media et minor. Moxico, Lumeje II (vers 11.30 S., 20.25 E.), sur une peau de mammifère en train de sécher. 26/I/1955, LUNA DE CARVALHO leg.

ANG. 10 292.1 et 2: des ouvrières maior, media, minor et minima, des larves et des nymphes. Nom indigène (tshokwe): Sumbututo.

Dundo, dans le fond d'un fossé récemment ouvert. La colonne des fourmis traversait celui-ci perpendiculairement à l'axe et allait d'un trou situé à la base d'une paroi à une autre paroi située en face. Un mâle sans ailes marchait au milieu de la colonne. 16/XI/1955, A. DE BARROS MACHADO leg.

Cet échantillon fut pris lors de l'exode.

II. Sous-genre *Anomma* Shuckard

3. *Dorylus nigricans burmeisteri* var. *molestus* Mayr

Cette forme fut décrite par GERSTAECKER en 1859. En 1862 il complète sa description en donnant le caractère typique de cette variété, à savoir la forme du pétiole: «die Form des