

13. *Dolichoderus moggridgei* FOR.

Für die Fauna von Afghanistan neu, bisher aus Sikkim und Assam bekannt (FOREL, 1902; BINGHAM, 1903).

Untersuchtes Material: Kandahar-Kuna, 950 m, 1 ♀.

Das afghanische Exemplar stimmt mit der Originalbeschreibung der Art (FOREL, 1902) überein, wurde jedoch mit den Typen nicht verglichen.

14. *Tapinoma melanocephalum* (F.)

Für Afghanistan neu, in den Tropen überall verbreitet (BINGHAM, 1903).

Untersuchtes Material: Kunartal, Jalalabad, 500 m, 2 ♀♀.

15. *Tapinoma simrothi karawajevi* EM.

Eine fast in ganz Afghanistan häufige Art (COLLINGWOOD, 1961a, 1961b; PISARSKI, 1967).

Untersuchtes Material: Kandahar, 950 m, Kandahar-Kuna, 950 m, Umgebung von Kabul, 1740 m, Djabel Seratsch 90 km nördlich von Kabul, 2000 m, zahlreiche ♀♀ und 1 ♂.

16. *Acantholepis sericea* FOR.

In Afghanistan von wenigen Fundorten im Hindukusch gemeldet (PISARSKI, 1967).

Untersuchtes Material: Umgebung von Kabul, 1740 m, einige ♀♀.

17. *Acantholepis kabulica* PISARSKI

Aus der Umgebung von Kabul beschrieben (PISARSKI, 1967).

Untersuchtes Material: Kandahar, 950 m, 1 ♀, Bashgultal, Nuristan, 1100 m, 1 ♀.

18. *Cataglyphis aenescens* (NYL.)

In Afghanistan aus dem westlichem Hindukusch gemeldet (PISARSKI, 1967).

Untersuchtes Material: Umgebung von Kabul, 950 m, 1 ♀.

19. *Cataglyphis cinnamomea* (KAR.)

In Afghanistan von einigen Fundorten im Hindukusch bekannt (PISARSKI, 1967).

Untersuchtes Material: Kandahar-Kuna, 950 m, einige ♀♀.

20. *Cataglyphis setipes karakalensis* ARN.

In Afghanistan von den südöstlichen Hängen des Hindukusch gemeldet (PISARSKI, 1967).

Untersuchtes Material: Sarobi, Kabulfuß, 900 m, 12. V. 1952, 1 ♂.