

Synsolenopsis (eine eingentümliche Kombination der *Pheidole*- und *Solenopsis*-ähnlichen Merkmale; - wenige und ziemlich seltene Arten im aussertropischen Süd-Amerika);

Oedaleocerus (mehr *Solenopsis*-artige Ameisen mit primitiveren männlichen Strukturen; hauptsächlich aride Zone Argentiniens);

Die Verteilung des spezialisierten Lebensformen der Ameisen je nach den Unterfamilien.

Lebensformen	Unterfamilien							
	Cerapachyinae	Dorylinae	Ponerinae	Pseudomyrmicinae	Myrmicinae	Dolichoderinae	Formicinae	
Schnell laufende Jaegerameisen der offenen Gelände	+	+	+	+	+	+	+	+
Wanderameisen	+	+	+	+	+	+	+	+
Ernteameisen	+	+	+	+	+	+	+	+
An den Bäumen lebende	+	+	+	+	+	+	+	+
Ameisen	+	+	+	+	+	+	+	+
Hypogaeische Ameisen	+	+	+	+	+	+	+	+
Honigköpfe	+	+	+	+	+	+	+	+
Weberameisen (<i>Oecophylla</i>)	+	+	+	+	+	+	+	+
« Viehzüchter »	+	+	+	+	+	+	+	+
Pilzzüchter	+	+	+	+	+	+	+	+
Sklavenjaeger	+	+	+	+	+	+	+	+
Sozialparasitische Ameisen	+	+	+	+	+	+	+	+

Diese Daten zeigen eindeutig, dass die Entwicklung der spezialisierten Lebensformen mit dem Grad der sozusagen « Sozialisierung » indirektem Zusammenhang steht.