

11. **C. Chiarinii**, var.?

Una ♂ dei Pozzi Maddo ha il capo ancora più lucido; il colore è quello degli esemplari più chiari del tipo. Trattandosi di unico individuo, e data la grande variabilità dei *Crematogaster*, non ho creduto conveniente dargli un nome.

12. **C. sp.?**

Due specie di ♀ ♀ di colore testaceo raccolte tra Matagoi e Lugh.

13. **Tetramorium sericeiventre**, Emery.

Da Matagoi a Lugh, una ♀.

14. **Camponotus maculatus**, F. tipo.

Lugh, ♂; da Matagoi a Lugh, ♂.

15. **C. rufoglaucus** Jerd. var. **cinctellus** Gerst.

Da Matagoi a Lugh, ♂.

Subsp. **Zimmermanni**, For.

Pozzi Maddo ♂.

16. **C. erythromelus**, n. sp.

♂. Nera, opaca, coperta di fitta punteggiatura, mandibole, antenne e zampe, comprese tutte le anche, interamente rosso sanguigno vivo; le lamine frontali e il margine della bocca sono pure colorati in rosso scuro. La pubescenza è scarsa e minutissima; vi sono poi grosse setole bianche piuttosto numerose sul metanoto e sul margine della squama; sulle altre parti, sono sostituite da scarsissimi peli sottili bianchicci. Il capo ha la forma solita nei *Camponotus* del gruppo *foraminosus-sericeus*, ma negli esemplari che ho d'innanzi (e tra i quali mi sembra che manchino tanto i massimi quanto i minimi), varia poco di forma e grandezza. Le guance hanno dei punti o fossette piuttosto piccoli e poco profondi, per cui la superficie non appare cariosa; mancano quasi del tutto nei più piccoli esemplari. Gli occhi sono grandi e molto piatti. Le lamine frontali divergenti, curvate, poco sinuate; il clipeo è appena convesso, con lobo brevissimo e largo. Le mandibole hanno 3 denti e sono fittamente punteggiate, opache. Lo scapo raggiunge od oltrepassa di poco l'occipite. Il torace è largo in avanti quasi quanto il capo, anche nei più grandi individui che ho veduti: il pronoto è largo quasi due