

Conviene separare queste dal gruppo schiettamente mediterraneo, composto delle forme seguenti:

- Sysphincta watasei* Wheel.
Trachymesopus sauteri Wbel.
Ponera japonica Wheel.
Stenamma owstoni Wheel.
Aphaenogaster (Attomyrma) famelica F. Sm.
 » » *aciculata* F. Sm.
Messor brunneicornis For.
Pheidole fervida F. Sm.
Crematogaster sordidula osakensis For.
 » » *nawai* Ito.
Myrmecina graminicola nipponica Wheel.
Leptothorax congruus F. Sm.
* *Tetramorium caespitum*.
* *Solenopsis fugax*
 Strumigenys japonica Ito.
 Camponotus fallax, quattro sottosp. proprie.
* » (*Colobopsis*) *truncatus* Spin.

Quasi tutte sono forme proprie, eccettuate tre, segnate con asterisco

Le specie indiano-malesi sono:

- Ectomomyrmex japonicus* Emery.
Brachyponera solitaria F. Sm.
Pheidole nodus F. Sm.
Vollenhovia emeryi Wheel.
* *Monomorium floridola* Jerd.
 » » *nipponense* Wheel.
 » » *triviale* Wheel.
Crematogaster laboriosa F. Sm.
Pristomyrmex japonicus For.
* *Strumigenys godeffroyi lewisi* Cam.
Iridomyrmex itoi Wheel.
Technomyrmex gibbosus Wheel.
Nylanderia flavipes F. Sm.
 » » *sakurae* Ito.
Camponotus (Myrmecina) itoi For.
* » (*Myrmoturba*) *habereri* For.
* » (*Colobopsis*) *rothneyi* For.
Polyrhachis lamellidens F. Sm.
 » » *latona* Wheel.
* » *mayri* Rog.
* » *dives* F. Sm.

Specie non proprie, segnate con asterisco, sei.