

tru colonizare aceleași condiții ca și specia *Cataglyphis cursor aenescens* Nyl.; aceasta din urmă are însă o arie de răspîndire mai mare, care cuprinde Cîmpia Română și are o mare frecvență în Dobrogea.

O răspîndire limitată are și specia *Dolichoderus quadripunctatus* care a fost colectată dintr-un cuib sub piatră. Ea a fost citată numai în sudul Dobrogei.

Specia termofilă *Plagiolepis pygmaea* Latr. a fost colectată cu fileul din inflorescențele composeelor și a leguminoaselor, folosind ca hrană nectarul acestor plante(?); a fost întîlnită frecvent în văile : Eșelniței, Mraconiei și din împrejurimile localității Svinița. Fiind o specie termofilă, își construiește cuibul în sol, pe cărări, în locuri însorite și în terenuri aride.

Unele specii ca : *Tetramorium caespitum* L., *Camponotus picca* Leach., *C. aethiops* Latr., *Lasius mixtus* Nyl. își construiesc cuibul în mod diferit. În cursul văii, cuibul sub piatră sau format în sol, iar la o altitudine de cca 100-200 m. (Sucaru Mic) aceleași specii își construiesc cuibul cu mușuroi. Această adaptare a speciilor în ceea ce privește construc-