

Ameisen der Rhön. Verteilung nach Bodenart und Höhenstufe.

	200 m	300 m	400 m	500 m	600 m	700 m	800 m	900 m
<i>Ponera coarctata</i> LATR.				□				
<i>Tapinoma erraticum</i> LATR.				□				
<i>Myrmica scabrinodis</i> NYL.				□□	○	○	■ ■	○○
<i>Myrmica ruginodis</i> NYL.	(+)			+	□□	○○	■ ■	
<i>Myrmica rubra</i> L.				□(+)		□	■	
<i>Myrmica sulcinodis</i> NYL.							■	
<i>Myrmica lobicornis</i> NYL.					□□			
<i>Myrmica rubida</i> LATR.				+			○○ (○)	
<i>Tetramorium caespitum</i> LATR.				++	□□□	○		
<i>Leptothorax acervorum</i> FAB.					□		■	○
<i>Leptothorax tuberum</i> FAB.				□				
<i>Lasius niger</i> L.			++	□ □ □	□□□	○○	■ ■ ○○	○○○
<i>Lasius alienus</i> FORST.			+	□ □ □	□□□			
<i>Lasius flavus</i> FAB.			+	++	○○○	○○	■ ■	○○
<i>Lasius umbratus</i> NYL.			+++	□□+	□□ □			○
<i>Lasius fuliginosus</i> LATR.			(++)					
<i>Camponotus herculeanus</i> L.				+□□			■ ■ ■ ○	
<i>Camponotus ligniperda</i> LATR.							○	
<i>Formica sanguinea</i> LATR.				□□	○	○○	○ ■ ■	○○
<i>Formica truncorum</i> FAB.							○	○○
<i>Formica nigricans</i> EM.			+++	□□		○		
<i>Formica polyctena</i> FORST.				(+)		(○)		
<i>Formica rufibarbis</i> FAB.					□□			
<i>Formica cunicularia</i> LATR.				□□+	○			
<i>Formica fusca</i> L.	(+)	+						
<i>Formica lemani</i> BONDR.			+□	□	○○○	○○○	■ ■ ■ ○○○	○○○
<i>Formica transcaucasia</i> NAS.							■ ■ ■	