

den där. Utan tvekan är uppgiften felaktig. På Öl. och Gtl. synes *Tetramorium* vara allmän men på fastlandet sällsynt och huvudsakligen förekommande i kusttrakterna, av de fåtaliga litteraturuppgifterna och fynden att döma. Så nämner Ringdahl (1921 s. 28) den från stranddyner i Sk., Adlerz från Ög.: skär utanför Slätbakens mynning (1893 s. 138) och Okna (1900 s. 162) samt Boh.: Väderöarna (1893 s. 134), Aurivillius (Ent. Tidskr. 1900 s. 283) från Upl.: Singö, och slutligen skriver Wahlgren (1915 s. 28) att Adlerz i brev meddelat att »trots särskild eftersökning endast ett samhälle anträffats» i Med. På Riksmuseum finnas ex. från Sk., Bl.: Karlskrona (Lundblad), Sm., Öl., Gtl., Boh.: Ödsmål, Jordhammar (Hanson), Stockholm (Boheman) och Upl.: Vassunda, Tursbo (ev. Uppsala, Lundblad) och på Statens Skogsforskningsinstitut ett par ex. från Bl.: Hällevik. Själv har jag aldrig sett arten i naturen.

Enligt Holgersen (1944 b) är *Tetramorium* i Norge en sydlig och sydvästlig kustart; i inlandet ha endast få fynd gjorts. I Danmark finns den dock över hela landet (Larsson 1943).

(3. *Dolichoderus quadripunctatus* L. uppges av Stitz [1939 s. 213] från Öl. och Gtl. under hänvisning till Stolpe. Detta är dock ett misstag. Stolpe skriver endast [1882 s. 139] »... kan möjligen finnas på Öland och Gotland». Mig veterligt föreligger ännu intet fynd från vårt land.)

4. *Lasius fuliginosus* Latr. synes ej vara sällsynt i S. Sverige. Enligt Svensk Insektfauna sträcker sig utbredningen till Med. Utom i litteraturen uppgivna fyndorter känner jag följande: Sk.: Dalby kronopark, granskog 1928 (förf.); S. Sandby, Fågelsång 1932 (Tjeder); Viken 1944 (Lundblad); Ivön 1946 (Lundblad). Hall.: Breared, Tönnersjöheden 1929 (förf.); Ö. Karup, Hemmeslöv 1939 (Tjeder). Vg.: Skara 1932 (Hanson); Mariestad 1936 (Hanson); Hökensås, bo under granrot 1946 (Heqvist). Boh.: Ljung, Lyckorna 1946 (Tjeder). Upl.: Stockholm, Experimentalfältet, bo i ek 1940—46 (Heqvist); Vassunda, Tursbo, bo under granrot 1939 (Lundblad); Uppsala, Vårdsätra, bo i alm (Lundblad); Danmark 1923 (förf.). Dlr.: Ludvika, Brunnsvik 1924 (förf.). Ly. lpm.: Lycksele, Sikselberg 1940 (Heqvist; lokalen ligger strax intill gränsen mot Vb.).

5. *Lasius niger* L. och *L. flavus* Fabr. äro enligt Svensk Insektfauna nordligast funna i Med. De gå dock ett gott stycke längre norrut. Så påträffade jag omkr. 1940 ett samhälle av *L. flavus* på en tallhed i Vb.: Degerfors, Svartberget, och Heqvist har tagit båda i Hällnäs i samma socken 1936 samt *flavus* på tallhed i Ly. lpm.: Lycksele, Sikselberg 1940, strax intill gränsen mot Vb.

I Lycksele stad och trakten V därom har jag genomskött flera lämpliga lokaler med negativt resultat. Så långt in i landet tyckas dessa arter inte gå häruppe. Tydligen höra de till den grupp av organismer,