

ensoleillées et sèches, ou sur les sables très perméables. Ici, nous sommes dans le deuxième cas. — Localités : Richelieu, Luynes, Pont-Boutard, Sainte-Maure-de-Touraine, Chinon ; Vienne : Loudun.

Formica fusca L. Partout sauf dans les endroits très secs. On la trouve en forêt dans les branches pourries, bien que FRANCŒUR (1966 p. 457-458) la classe, au Canada, parmi les espèces de lisière.

Formica rufa L. et *F. pratensis* Retz. çà et là dans les forêts et leurs lisières ; la seconde espèce recherche plus le soleil : à Richelieu, elle vit en peupleraie claire (station 28). On la trouve aussi dans les landes du Ruchard (Forêt de Chinon).

Formica rufibarbis Fab. Recherche les lieux très ensoleillés : Chinon (les Loges), Grand-Pressigny ; Champigny (Maine & Loire).

Formica sanguinea Latr. assez rare. — Localités : Landes du Ruchard, Forêt de Chinon (Saint-Benoît-la-Forêt) ; Loudun (Vienne).

Lasius niger L. Fourmi très ubiquiste : se trouve dans la peupleraie marécageuse de Richelieu et partout dans les forêts, les champs, sauf dans les pelouses sèches où elle est remplacée par *Lasius alienus*. Pour GASPARD (1965b p. 220), *Lasius niger* ne pénètre que de quelques mètres à l'intérieur des forêts de Belgique. Tel n'est pas le cas dans nos forêts où elle colonise de nombreuses souches.

Lasius brunneus Latr. et *L. emarginatus* Ol. sont assez communes en Touraine, sauf dans les forêts. *L. emarginatus* nidifie souvent dans les murs (par exemple ceux de la station de Richelieu).

Lasius alienus Foerst. se trouve à Richelieu uniquement en station 36, ce qui confirme l'observation de GASPARD (1965b p. 222) qui, en Belgique, ne rencontre l'espèce que dans les endroits secs et chauds. Par contre, FRANCŒUR (1966 p. 454) la récolte fréquemment dans les forêts froides du Québec. — Localités : Richelieu, Chinon (les Loges), Luynes, Sainte-Maure-de-Touraine ; Champigny (Maine et Loire).

Lasius flavus L. et *L. rabaudi* Bondr. nidifient dans les prairies — *L. flavus* : partout — Localités pour *L. rabaudi* : Luynes, Chinon.

Lasius fuliginosus Latr. peu fréquente dans les forêts assez claires — Localités : Forêt de Chinon, Ballan, Sainte-Maure-de-Touraine, Tours (Parc Grandmont).

Camponotus ligniperda Latr. rare, dans les souches de la forêt de Chinon.

3 - FAUNE MÉDITERRANÉENNE

a) Espèces à grande distribution

Aphænogaster subterranea Latr. représente, d'après BERNARD (1968 p. 57), un élément méditerranéen mais qui supporte les climats du Nord grâce à sa vie hypogée. Sa présence en Touraine n'a donc rien de remarquable. Partout dans les futaies et les bois, parfois dans les souches en l'absence de pierres.

Dolichoderus quadripunctatus L. remonte plus au Nord que les espèces suivantes, puisqu'en dehors de Fontainebleau (BONDROIT in BERNARD 1968 p. 250, COLLINGWOOD 1956 p. 107) elle existe en Belgique (BONDROIT 1918 p. 87). Dans l'ouest, elle était signalée en Forêt de Vouvant (Vendée, BARRETT 1968 p. 154) et en Maine-et-Loire (MILLET DE LA TURTAUDIÈRE 1872 p. 64). Cette fourmi n'est certainement pas très méridionale, mais plutôt difficile à trouver car elle vit sur les hautes branches des chênes (TOROSSIAN 1967). — Localités : Richelieu, Forêt de Villandry, Tours (Parc de Grandmont) ; forêt de Fouilloux (Deux-Sèvres).