

## Tetramorium Mayr.

### *T. caespitum* L.

Fayal: Horta, 11.—14. VII., 1 Ex. (Fr.). — Graciosa: 17. VII., 2 Ex. (Fr.). — San Miguel: Pico de Vara, 23. V., 1 Ex. (Fr.).

V e r b : Ganz Europa, Nordafrika, Nord- und Mittelasien.

### *T. guil* :e Fabr.

Corvo: Nova, 27. VI., 2 Ex. (St.). — Fayal: Ribeira div., 1. VII., 1 Ex. (Fr.).

V e r b r.: Kosmopolit i den warmen Ländern. Heimat: Afrika.

## Iridomyrmex Mayr.

### *I. humilis* Mayr.

Flores: Sta. Cruz, VI., 13 Ex. (St.). — San Jorge: Calheta, 14.—28. VI. & 16. VII., 20 Ex. (Fr., St.); Ribeira do Salto, 18.—23. VI., 1 Ex. (Fr.). — San Miguel: Ribeira Grande, 26. V., 2 Ex. (Fr.); San Roque, 13.—15. V. & 21. VII., 11 Ex. (Fr., St.); Sete Cidades, 17. V. 1 Ex. (Fr.). — Terceira: Angra do Heroismo, 29. VI. & 6. VI., 1 Ex. (Fr.); Monte Brazil, 29. V.—2. VI., 5 Ex. (Fr.); Praia da Victoria, 8.—10. VI., 3 Ex. (Fr.).

V e r b r.: Kosmopolit. Heimat: Südamerika, dortvon in U.S.A., Nord- und Südafrika und Westeuropa eingeschleppt.

## Lasius Fabr.

### *L. niger* L.

Fayal: Horta, 30. VI.—5. VII., 3.—5. VII., 11.—14. VII., 10 Ex. (Fr., St.); Ribeira Flamengos, 13. VII., 3 Ex. (St.); Ribeiras div., 1. VII., 8 Ex. (Fr.). — Flores: Ribeira Fazenda, VI., 1 Ex. (St.); Sta. Cruz, VI. & 16.—30. VI., 9 Ex. (St.); Vales, VI., 2 Ex. (St.). Graciosa: 17. VII., 15 Ex. (Fr.). — Pico: Lagoa do Caiado, 7. VII., 1 Ex. (St.); Madalena, 6.—9. VII., 3 Ex. (Fr., St.); Silveira, 7. VII., 1 Ex. (St.). — San Jorge: Calheta, 14.—28. VI. & 16. VII., 11 Ex. (Fr., St.). — San Miguel: Furnas, 19.—21. V., 17. VII., 23. VII.—1. VIII., 9 Ex. (Fr., St.); Lagoa do Fogo, 2. VIII., 4 Ex. (Fr.); Ponta Delgada, 14.—16. V., 14 Ex. (Fr., St.); Ribeira Grande, 26. V., 12 Ex. (Fr., St.); Ribeira Quente, 30. VII., 1 Ex. (Fr.); Sete Cidades, 17. V., 3 Ex. (Fr.). — Terceira: Achada, 3.—4. VI., 1 Ex. (Fr.); Angra do Heroismo, 29. V.—6. VI., 1 Ex. (Fr.); Bagacina, 17. VII., 4 Ex. (Fr., St.); Monte Brazil, 29. V.—2. VI., 1 Ex. (Fr.); Praia da Victoria, 8.—10. VI., 8 Ex. (Fr.); Sta. Barbara, 7. VI., 2 Ex. (Fr.).

V e r b r.: Ganz Europa, Nordafrika, Nordasien. — Bemerkenswert ist, dass diese weit verbreitete und überall sehr gemeine Art, hier, sowie auf Madeira und den Kanarischen Inseln des öfteren in einer Form mit auffallend lichthem, braunrötlichem Thorax und Petiolus auftritt. In Anbetracht der grossen allgemeinen Variabilität dieser Art, möchte ich jedoch nicht diese azorische Form als eine besondere Rasse oder Varietät bezeichnen.

Ausser den hier erwähnten Ameisenarten sind noch folgende auf den Azorischen Inseln angetroffen worden:

### *Ponera eduardi* For.

*Tetramorium simillimum* Sm. var. *insularis* Sants. (Kosmopolit).

*Lasius niger* L. var. *grandis* For.