

Oxyopomyrmex Er. André**O. insularis** Santschi

Kanarische Funde: *Tenerife*: Medano (Cabrera y Diaz), loc. typ.: La Esperanza, 31. 5. 47, 1 ♀ (L).

Ökologie: Liebt sandiges, trockenes Gelände. Gräbt kleine, unterirdische Nester mit Vorratskammern, in welchen sie Körner sammelt.

Verbreitung: Endemische Art.

O. insularis Santschi var. **major** Santschi

Kanarische Funde: *Tenerife*: Medano (Cabrera y Diaz), loc. typ.:

Ökologie: Wie die vorige.

Verbreitung: Endemische Form.

Pheidole Westwood**P. megacephala** Fabr.

Kanarische Funde: *Tenerife*: (Noualhier, Cabrera y Diaz); Tegina (Lelmann); Orotava (Tessmann). — *Gran Canaria*: (Alluaud); Arucas (Wheeler).

Ökologie: Liebt sandiges, trockenes Gelände. Nester in der Erde, meist unter Steinen.

Verbreitung: Kosmopolitische Ameise, in den Tropen weit verbreitet. Heimat: Madagasear.

P. teneriffana Forel

Kanarische Funde: *Tenerife*: Laguna (Medina), loc. typ. — *Gran Canaria*: Las Palmas (Cabrera y Diaz); ibidem, 2. 4. 49, 6 ♂ (L). *Lanzarote*: Haria & Uga (Wheeler).

Ökologie: Wie die vorige.

Verbreitung: Kosmopolitische Art, wie die vorige.

Cardiocondyla Emery**C. emeryi** Forel

Kanarische Funde: *Tenerife*: Guimar, 2. 6. 47 & 12. 1. 49, 3 ♀ (L); Puerto de la Cruz, 13. 1. 49 & 2—4. 2. 49, 2 ♂, 1 ♀ (L); Santa Cruz, 10. 1. 49, 24 ♂ (L). — *Gran Canaria*: Maspalomas, 24—26. 2. 49, 2 ♀ (L). *Fuerteventura*: Chiligua, 4—14. 3. 49, 1 ♂ (L).

Ökologie: Liebt trockene Gegenden; Nester in der Erde mit enger Eingangsöffnung.

Verbreitung: Kosmopolitische Art. Heimat in Asien, wovon durch den Handelsverkehr nach Madagasear, Syrien, Madeira und den Antillen verbreitet.

Crematogaster Lund**C. alluaudi** Emery

Kanarische Funde: *Hierro*: El Golfo Frontera, 28. 3. 50, 5 ♂ (L). *La Palma*: (Alluaud) loc. typ.; Caldera, 25. 5. 47, 6 ♂ (L); El Paso, 26. 5. 47, 1 ♂