

Ökologie: Wie die vorige.
 Verbreitung: Endemische Varietät.

M. medinae Forel

Kanarische Funde: *Tenerife*: Laguna (Cabrera y Diaz) loc. typ.
 Ökologie: Wie die vorige.
 Verbreitung: Endemische Art.

M. salomonis L.

Kanarische Funde: *Tenerife*: (Cabrera y Diaz); Orotava (Heymons); El Medano, 24—25. 1. 49, 28. 2. 50, 22 ♂, 7 ♀ (L); Puerto de S. Juan, 16—22. 1. 49, 10 ♂ (L).

Ökologie: Wie die vorige.
 Verbreitung: Nord-Afrika, Madeira, Syrien, Kaukasien, Central-Asien.

M. salomonis L. ssp. *subopacum* Emery

Kanarische Funde: *La Gomera*: Valle Hermigua, 18. 3. 50, 1 ♂ (L). — *Tenerife*: (Cabrera y Diaz, Fea, Noualhier); Las Mercedes, 3. 4. 49, 1 ♂ (L); Santa Cruz, 4. 4. 49, 2 ♂ (L); Valle de Masca, pars superior 1,000 m., 21. 2. 50, 14 ♂, 2 ♀ (L); Valle de Santiago 1,000 m., 20—21. 2. 50, 2 ♂ (L). — *Gran Canaria*: (Alluaud); Goberas (Wheeler); Las Lagunetas, 12. 3. 50, 2 ♂ (L); Maspalomas, 24—26. 2. 49 & 9—10. 3. 50, 23 ♂, 7 ♀ (L); Tamadabe, 30. 3. 49, 20 ♂, 1 ♀ (L); Valle de Tejada, 7. 6. 47, 1 ♂ (L). — *Fuerteventura*: (Noualhier); Chilegua, 4—14. 3. 49, 3 ♂ (L); Matural, 18. 3. 49, 2 ♂ (L).

Ökologie: Wie die vorige.
 Verbreitung: Madeira, Spanien, Sardinien, Sicilien, Griechenland, Nord-Afrika, Rhodesien.

M. salomonis L. ssp. *subopacum* Emery var. *intermedium* Wheeler

Kanarische Funde: *La Palma*: Barranco de las Angustias (Wheeler), loc. typ. — *Lanzarote*: Haria & Uga (Wheeler); Haria, 19. 3. 49, 24 ♂ (L); Monte de las Nieves, 19. 3. 49, 1 ♂ (L).

Ökologie: Wie die vorige.
 Verbreitung: Endemische Form.

M. destructor Jerdon

Kanarische Funde: *Tenerife*: (Noualhier); Santa Cruz (Cabrera y Diaz).

Ökologie: Wie die vorige.
 Verbreitung: In den Tropen weit verbreitet und durch den Handelsverkehr nach den Kanarischen Inseln eingeschleppt.

Paraphacota Santschi

P. cabraerae Santschi

Kanarische Funde: *Tenerife*: Laguna (Cabrera y Diaz) loc. typ.