

L. canescens Santschi

Kanarische Funde: *Tenerife*: Medano (Cabrera y Diaz) loc. typ.; Adeje. 21. 1. 49. 2 ♀ (L):

Ökologie und Verbreitung: Wie die vorigen.

L. elongatus Santschi

Kanarische Funde: *Tenerife*: Laguna (Cabrera y Diaz) loc. typ.

Ökologie und Verbreitung: Wie die vorigen.

L. gracilicornis Emery

Kanarische Funde: *Tenerife*: In der Nähe von Pico di Teyde (Fea), loc. typ.; Bermejo. 11. 2. 49, 8 ♀ (L); Teyde, Cañadas, 20. 5. 47 & 14—15. 2. 49, 12 ♂, 1 ♀ (L).

Ökologie und Verbreitung: Wie die vorigen.

L. hesperius Santschi

Kanarische Funde: *Tenerife*: (Cabrera y Diaz), loc. typ.; Fuente Frio 1,300 m., 5. 4. 49, 3 ♀ (L); Portillo 2,000 m., 17. 4. 50, 1 ♀ (L); Teyde, Cañadas, 20. 5. 47, 2 ♀ (L); Valle de Masca, 12—13. 5. 47, 1 ♀ (L). — *Gran Canaria*: Maspalomas, 24—26. 2. 49 & 9—10. 3. 50, 1 ♀, 1 ♀ (L).

Ökologie und Verbreitung: Wie die vorigen.

L. nivarianus Santschi

Kanarische Funde: *Tenerife*: Monte Aguirre (Mas de Xarxas), loc. typ. — *Hierro*: El Golfo, Frontera. 28. 3. 50, 1 ♀ (L).

Ökologie und Verbreitung: Wie die vorigen.

L. nivarianus Santschi var. **guancha** Santschi

Kanarische Funde: *Tenerife*: (Cabrera y Diaz), loc. typ.

Ökologie und Verbreitung: Wie die vorigen.

L. risi Forel

Kanarische Funde: *Gran Canaria*: Las Palmas, loc. typ.; Galdar. 23. 2. 49, 2 ♀ (L).

Ökologie und Verbreitung: Wie die vorigen.

L. risi Forel ssp. **armouri** Wheeler

Kanarische Funde: *Gran Canaria*: Azuaje, Barranco de la Virgen (Wheeler), loc. typ.

Ökologie und Verbreitung: Wie die vorigen.

L. risi Forel ssp. **globulinodis** Santschi

Kanarische Funde: *Gran Canaria*: (Alluaud), loc. typ.; Cruz de Tejada 1,450 m., 1. 4. 49 & 6—8, 11—13. 3. 50, 19 ♂, 2 ♀ (L); Las Lagunetas, 1. 4. 49, 4 ♀ (L).

Ökologie und Verbreitung: Wie die vorigen.