

L. roittenbergi Emery ssp. **scabrosus** SantschiKanarische Funde: *Lanzarote*: Ins. Graciosa, 20. 3. 49, 3 ♀ (L).

Ökologie: Wie die vorigen.

Verbreitung: Algerien.

Tetramorium Mayr**T. caespitum** L. ssp. **semilaeve** E. André var. **depressum** Forel

Kanarische Funde: *Hierro*: El Golfo, Frontera, 28. 3. 50, 7 ♀ (L); El Pinar, 27. 3. 50, 25 ♀ (L); Guarasoca, 26. 3. 50, 1 ♀ (L). *La Gomera*: El Cedro m., 23. 3. 50, 8 ♀ (L); San Sebastian, 17. 3. 50, 2 ♀ (L); Valle de la Rosa, 19. 3. 50, 2 ♀ (L). — *Tenerife*: (Noualhier); Laguna, Monte Agua Garcia, Los Rodeos (Cabrera y Diaz); Orotava, El Guerra (Heymons); Agua Garcia (Lehmann); Bercejo, 11. 2. 49, 12 ♀ (L); Buenavista, 13. 2. 49, 2 ♀ (L); Fuente Fria 1,300 m., 5. 4. 49 & 19. 4. 50, 9 ♀ (L); La Esperanza, 31. 5. 47, 16 ♀, 3 ♂ (L); Monte Agua, 5. 2. 49 & 6. 2. 50, 31 ♀ (L); Monte Aguirre, 17. 2. 49, 2 ♀ (L); Puerto de S. Juan, 16–22. 1. 49, 20 ♀ (L); San Miguel, 26. 1. 49, 16 ♀ (L); Santa Cruz, 14. 4. 49, 1 ♀ (L); Supra Orotava, 14–15. 5. 47, 10 ♀ (L); Valle de Masca, 12–13. 5. 47, 1 ♀ (L); Valle de Santiago 1,000 m., 12–13. 5. 47, 32 ♀, 6 ♀, 11 ♂ (L); Vuelta de Taganana, 16–17. 2. 50, 1 ♀ (L). — *Gran Canaria*: (Alluaud); Las Palmas (Ris), loc. typ.; Azuaje, Barranco de la Virgen & Los Tilos (Wheeler); Aldea S. Nicolas, 1. 3. 49, 1 ♀ (L); Arquinequin, 26. 2. 49, 3 ♀ (L); Bandama 500 m., 5. 3. 50, 8 ♀, 2 ♀ (L); Aldar, 23. 2. 49, 1 ♀, 1 ♀ (L); Cruz de Tejeda 1,4450 m., 6–8, 11–13. 3. 50, 40 ♀ (L); Las Lagunetas, 1. 4. 49, 1 ♀ (L); Las Palmas, 20–22. 2. 49, 7 ♀, 2 ♀ (L); Masalomas, 24–26. 2. 49 & 9–10. 2. 50, 26 ♀, 8 ♀, 8 ♂ (L); Tamadabe, 30. 3. 49, 37 ♀ (L); Tirajana, S. Bartholomé, 14. 3. 50, 2 ♀ (L); Valle de Tejeda, 26–29. 3. 49, 1 ♀ (L). — *Fuerteventura*: (Alluaud); Betencuria, 11. 3. 49, 1 ♀, 1 ♀ (L); Chilagua, 4–14. 1. 49, 4 ♀, 1 ♀ (L); Jable, 5–8. 3. 49, 2 ♀ (L); La Oliva, 16. 3. 49, 2 ♀ (L). *Lanzarote*: Alalaya, 25. 3. 49, 7 ♀, 4 ♀, 2 ♂ (L); Haría, 19. 3. 49, 3 ♀, 1 ♀, 1 ♂ (L).

Ökologie: Liebt trockenenes, sonniges Gelände. Die manchmal sehr stark volkerten Nester werden in der Erde, oft unter Steinen gegraben.

Verbreitung: Endemische Varietät.

T. caespitum L. ssp. **semilaeve** var. **fortunatarum** Emery

Kanarische Funde: *La Gomera*: Valle Hermigua, 18. 3. 50, 1 ♀ (L). *Tenerife*: (Noualhier, Cabrera y Diaz); Puerto de la Cruz, 7–8. 5. 47, 13. 1. 49, 1–4. 2. 49, 10. 4. 50, 7 ♀, 1 ♀ (L); Puerto de S. Juan, 16–22. 1. 49, 12 ♀ (L). — *Gran Canaria*: (Alluaud); Azuaje, Barranco de la Virgen (Wheeler); Arquinequin, 8. 2. 49, 1 ♀ (L); Las Palmas, 20–22. 2. 49, 4 ♀ (L). — *Fuerteventura*: (Alluaud) loc. typ.; Chilagua, 4–14. 3. 49, 4 ♀ (L).

Ökologie und Verbreitung: Wie die vorige.

T. caespitum L. ssp. **semilaeve** var. **guancha** Santschi

Kanarische Funde; *Tenerife*: Medano (Cabrera y Diaz) loc. typ.; Monte Aguirre (Mas de Xarxas);

Ökologie und Verbreitung: Wie die vorige.