

**T. caespitum** ssp. **semilaeve** var. **palmense** Wheeler

Kanarische Funde: *La Palma*: Caldera Barranco de las Angustias & Bella Vista (Wheeler), loc. typ.

Ökologie und Verbreitung: Wie die vorige.

**T. caespitum** L., ssp. **biskrense** Forel

Kanarische Funde: *Tenerife*: Orotava, Barranco de la Reina (Tessmann).

Ökologie: Wie die vorige.

Verbreitung: Algerien und Tunisien.

Subfam. **Dolichoderinae****Iridomyrmex** Mayr**I. humilis** Mayr

Kanarische Funde: *Hierro*: Valverde 600 m., 24–30. 3. 50, 5 ♀ (L); — *La Palma*: Los Llanos und San Andrés (Wheeler); El Pinar 1,300 m., 5. 4. 50, 1 ♀ (L); Los Llanos. 23. 5. 47, 8 ♀ (L); Santa Cruz de la Plama, 1. 4. 50, 1 ♀ (L); Supra El Paso 600 m., 4. 4. 50, 3 ♀ (L). — *La Gomera*: El Cedro 1,000 m., 23. 3. 50, 1 ♀ (L); Supra S. Sebastian, 21. 3. 50, 2 ♀ (L); Valle Hermigua, 18. 3. 50, 1 ♀ (L). — *Tenerife*: Orotava (Heymons, Michaelis, Lehman); Icod, Laguna, San Juan de la Rambla, Santa Cruz, Santa Ursula, Villa & Puerto de Orotava (Wheeler); Adeje. 24. 2. 50, 3 ♀ (L); Agua Mansa, 15. 5. 47 & 8. 2. 49, 2 ♀ (L); Buenavista, 13. 2. 49 & 12–13. 4. 50, 4 ♀ (L); Granadilla, 23–24. 1. 49 & 26. 2. 50, 8 ♀ (L); Guimar, 2. 6. 47 & 12. 1. 49, 14 ♀ (L); Las Arenas, 9. 5. 47, 2 ♀ (L); Las Calletas, 27. 1. 49, 1 ♀ (L); Las Cañadas 2,300 m., 16–17. 4. 50, 1 ♀ (L); Las Mercedes, 28–30. 5. 47, 30. 1. 49. 3. 4. 49, 12 ♀, 2 ♀ (L); Monte Aguirre 700 m., 2. 4. 50, 1 ♀ (L); Puerto de la Cruz, 7–8. 5. 47, 13. 1. 49, 2–4. 2. 49, 30 ♀, 1 ♀, 9 ♂ (L); Barranco Martiane, 19. 2. 50, 2 ♀ (L); Puerto de S. Juan, 16–22. 1. 49 & 23. 2. 50, 6 ♀ (L); Santa Cruz, 10. 1. 49, 5 ♀ (L); Santa Ursula, 18. 5. 47 & 3. 2. 49, 9 ♀ (L); Silos, 12. 2. 49, 2 ♀ (L); Supra Icod, 9. 5. 47, 1 ♀ (L); Tamaimo 600 m., 22. 2. 50, 1 ♀ (L); Valle de S. Andrés, 2. 3. 50, 1 ♀ (L); Valle de Santiago 1,000 m., 12–13. 5. 47 & 20–21. 2. 50, 42 ♀, 3 ♀ (L); Valle de Segovia 500 m., 13. 4. 50, 7 ♀ (L); Vuelta de Taganana 700 m. 16–17. 2. 50, 1 ♀ (L); Vilaflor 1,500 m., 27. 2. 50, 2 ♀ (L). — *Gran Canaria*: Arucas, Galdar, Las Palmas, Puerto de la Cruz, San Lorenzo, Telde und Teror (Wheeler); Arucas, 2. 3. 49 & 27. 3. 49, 5 ♀, 3 ♀ (L); Aldea S. Nicolas, 1. 3. 49, 14 ♀ (L); Arquequin, 26. 2. 49, 1 ♀ (L); Bandama, 5. 3. 50, 12 ♀, 1 ♀ (L); Galdar, 23. 2. 49, 4 ♀ (L); Las Lagunetas, 1. 4. 49, 2 ♀ (L); Las Palmas, 5–6. 6. 47 & 20–22. 2. 49, 11 ♀, 1 ♀ (L); Maspalomas, 24–26. 2. 49, 2 ♀ (L); Santa Brigida, 21. 2. 49, 9 ♀, 3 ♀ (L).

Ökologie: Liebt warmes, nicht allzu feuchtes Kulturgelände. In Europa meist in Gewächshäusern aber auch im Freien. Nester in der Erde, in Höhlungen von Bäumen, unter Borke gefällter Stämme, Kompost- und Düngerhaufen u.s.w. Sehr schädlich für Bananpflanzungen. Auch als lästiger Hausameise bekannt.

Verbreitung: Kosmopolit. Heimat in Brasilien und Argentinien. Durch den Handelsverkehr in U.S.A., Azoren, Madeira, Süd- und Centraleuropa, Nord- und Südafrika u.s.w. eingekommen.