

Subfam. Formicinae

Plagiolepis Latr.

P. barbara Santschi var. **canariensis** Santschi

Kanarische Funde: *Hierro*: Cumbre, El Bresal, 1,300 m., 27--29. 3. 50, 1 ♀ (L); El Golfo Frontera, 28. 3. 50, 1 ♀ (L); Guarasoca, 26. 3. 50, 1 ♀ (L). — *Gomera*: El Cedro 1,000 m., 23. 3. 50, 1 ♂ (L); Valle de la Rosa, 19. 3. 50, 1 ♀ (L). — *Tenerife*: (Noualhier); Tegina (Lehmann); Agua Mansa (Tessmann); Retamas Heymons); La Laguna (lovr. typ.), Bejano und Esperanza (Cabrera y Diaz); Agua Mansa, 15. 5. 47, 5 ♀ (L); Fuente Fria, 5. 4. 49, 1 ♀ (L); Granadilla, 26. 2. 50, 1 ♀ (L); Mimar, 2. 6. 47, 1 ♀ (L); Laguna, 4. 6. 47, 1 ♀ (L); La Esperanza, 11. 5. 47, 5 ♀ (L); Las Calletas, 27. 1. 49, 1 ♀ (L); Las Cañadas 2,300 m., 16--17. 4. 50, 2 ♀, 1 ♀ (L); Las Mercedes, 28--30. 5. 47, 1 ♀, 2 ♀ (L); Monte Agua, 6. 2. 49, 21 ♀ (L); Puerto de la Cruz, 7--8. 5. 47, 1 ♀ (L); Barranco Martianez, 19. 2. 50, 1 ♀ (L); Puerto de S. Juan, 23. 2. 50, 1 ♀ (L); San Miguel, 26. 1. 49, 1 ♀ (L); Santa Cruz, 14. 1. 49, 1 ♀ (L); Tamaimo 600 m., 22. 2. 50, 1 ♀ (L); Valle de Masca 1,000 m., 21. 2. 50, 16 ♀, 1 ♀ (L); Valle de Santiago 1,000 m., 20--21. 2. 50, 14 ♀ (L); Vilaflor 1,500 m., 8 ♀ (L); Puerta de Taganana 700 m., 16--17. 2. 50, 1 ♀ (L). — *Gran Canaria*: Arucas (Wheeler); Aldea S. Nicolas, 1. 3. 49, 1 ♀ (L); Cruz de Tejeda 1,450 m., 6--8 & 11--13. 3. 50, 2 ♀ (L); Maspalomas, 9--10. 3. 50, 4 ♀ (L). — *Fuerteventura*: Betencuria, 11. 3. 49, 1 ♀, 3 ♀ (L); Chilogua, 4--14. 3. 49, 30 ♀, 3 ♀ (L); Jable, 5--6. 3. 49, 1 ♀ (L). — *Lanzarote*: Uga (Wheeler); Haria, 19. 3. 49, 1 ♀ (L); Monte Corona, 21. 3. 49, 1 ♀ (L); Monte de las Nieves, 19. 3. 49, 1 ♀ (L).

Ökologie: Findet sich an trockenen, heißen Stellen mit spärlichem, dünnem Pflanzenwuchs. Nester unter Steinen. Unter den Nestbewohnern fallen einige mit stark ausgedehntem und prall gefülltem Hinterleib auf, die vermutlich, wie bei einigen anderen Arten dieser Gattung, als »lebende Honigtöpfe« angewendet werden.

Verbreitung: Endemische Form.

P. pallescens Forel ssp. **maura** Santschi

Kanarische Funde: *La Palma*: Barranco de las Angustias (Wheeler); Paso 600 m., 26. 5. 47 & 4. 4. 50, 12 ♀ (L); Los Llanos, 23. 5. 47, 1 ♀ (L). — *Tenerife*: Laguna (Cabrera y Diaz).

Ökologie: Wie die vorige.

Verbreitung: Marokko, Algerien, Tunesien.

Camponotus Mayr**C. compressus** Fabr. ssp. **thoracicus** Fabr. var. **carinatus** Brullé

Kanarische Funde: *Tenerife*: Umgebung von Pico de Teyde (Fea); *Fuerteventura*: (Alluaud); Betencuria, 11. 3. 49, 10 ♀ (L); Corralejo, 16--17. 3. 49, 1 ♀ (L); Jable, 5--8. 3. 49, 11 ♀ (L); La Oliva, 16. 3. 49, 2 ♀ (L). — *Lanzarote*: (Fea); *La Graciosa* (Wheeler); *Atalaya*, 25. 3. 49, 1 ♂ (L); Tegise, 22. 3. 49, 1 ♀ (L).