

1. 47 & 20—21. 2. 50, 3 ♀ (L). — *Fuerteventura*: Betencuria, 11. 3. 49, 2 ♀ (L); Matilla, 16. 3. 49, 1 ♀ (L). — *Lanzarote*: Haria (Wheeler); ibidem 19. 3. 49, 1 ♀ (L).

Ökologie und Verbreitung: Wie die vorigen.

C. rufoglaucus ssp. feae var. excelsus Emery

Kanarische Funde: *Tenerife*: 2,000 m. (Alluaud) loc. typ.; Fuente de Pedro, Monteverde, Orotava (Heymons); Medano (Cabrera y Diaz); El Medano, 14—25. 1. 49 & 28. 2. 50, 23 ♀ (L); Granadilla, 26. 2. 50, 14 ♀, 2 ♀ (L); La Esperanza, 11. 5. 47, 6 ♀ (L).

Ökologie und Verbreitung: Wie die vorigen.

C. lateralis Oliv. var. guancha Santschi

Kanarische Funde: *Hierro*: El Golfo Frontera, 28. 3. 50, 2 ♀ (L); Las Rocas, 26. 3. 50, 4 ♀ (L). — *La Palma*: El Paso, 26. 5. 47, 1 ♀ (L). *Tenerife*: Noualhier; El Val de Gimenez, Garachico (loc. typ.) und Laguna (Cabrera y Diaz); Agua Mansa (Tessmann); Adeje, Barranco del Infierno, 24. 2. 50, 2 ♀ (L).

Ökologie und Verbreitung: Wie die vorigen.

Paratrechina Motsch.

P. longicornis Latr.

Kanarische Funde: *Tenerife*: (Cabrera y Diaz); Orotava (Heymons). *Lanzarote*: Yaiza (Wheeler).

Ökologie: In Europa meist in Gewächshäuser, Blumengärten und dergl. Verbreitung: Kosmopolit. In der ganzen Tropenwelt verbreitet. Durch den Handelsverkehr eingeführt.

Lasius Fabr.

L. niger L.

Kanarische Funde: *La Palma*: Barranco de las Angustias und Las Mitas (Wheeler); Caldera, 25. 5. 47, 1 ♀ (L); Supra El Paso, El Pinar 1,300 m., 4. 50, 2 ♀ (L). — *La Gomera*: Valle de la Rosa, 19. 3. 50, 1 ♀ (L); Valle Hermigua, 13. 3. 50, 2 ♀ (L). — *Tenerife*: (Cabrera y Diaz, Noualhier); Orotava (Heymons, Tessmann); Barranco Ruiz, Las Mercedes und Icod (Wheeler); Anaga, Afur 950 m., 2. 50, 9 ♀ (L); Bailadero 700 m., 23. 4. 50, 2 ♀ (L); Fuente Fria 1,300 m., 19. 4. 50, 1 ♀ (L); Las Cañadas, 14—15. 2. 49 & 16—17. 4. 50, 9 ♀ (L); Las Mercedes, 30. 1. 49, 1 ♀ (L); Monte Aguirre, 17. 2. 49, 6 ♀, 1 ♀ (L); Supra Icod, 9. 5. 47, 4 ♀ (L); Valle Masca, 12—13. 5. 47, 12 ♀ (L); Vuelta de Taganana 700 m., 16—17. 2. 50, 1 ♀ (L). — *Gran Canaria*: (Noualhier); Azuaje, Barranco, de la Virgen, Los Tilos und San Juan (Wheeler); Aldea de S. Nicolas, 1. 2. 49, 1 ♀ (L); Cruz de Tejada 1,450 m., 1. 49 & 6—8, 11—13. 3. 50, 2 ♀ (L); Valle de Tejada, 7. R. 47 & 28—29. 3. 39, 1 ♀ (L); Maspalomas, 24—26. 2. 49 & 9—10. 3. 50, 7 ♀ (L).

Ökologie: Findet sich beinahe überall, auf unbearbeitetem sowie auf Kulturland, meistens doch nur in den höheren Regionen. Nester meist in der Erde, unter Steinen oder auch ganz frei, in morschen Baumstümpfen, in den Hohlknochen, unter deren abgelöster Rinde u.s.w. Auch als lästige Hausameise bekannt.