

NUOVE LOCALITÀ DI RACCOLTA. — Ho ricevuto un'operaia di questa specie raccolta ad Acilia (Roma, VII-46, O. CASTELLANI leg.) ed altre raccolte nell'Appennino Abruzzese (Val de' Varri, IX-47), (P. BISLETI leg.).

PUBBLICAZIONI CONSULTATE

- DELLA BEFFA G., 1935. — *Le Formiche del Piemonte*. — Boll. Lab. Sperim. Fitop. Torino, 1935, pp. 1-15.
- EMERY C., 1916. — *Fauna Entomologica Italiana*. I Hymenoptera-Formicidae. — Boll. Soc. Entom. Ital., Firenze, XLVII, 1915 (1916), pp. 79-275, figg. 1-92.
- FINZI B., 1927. — *Terzo contributo alla conoscenza della Fauna Mirmecologica della Venezia Giulia*. — Boll. Soc. Entom. Ital., Genova, LIX, 1927, pp. 7-10.
- FINZI B., 1928. — *Quarto contributo alla conoscenza della Fauna Mirmecologica della Venezia Giulia*, — Boll. Soc. Entom. Ital., Genova, LX, 1928, pp. 128-130.
- FINZI B., 1929. — *Le Forme Italiane del Genere Messor*. — Boll. Soc. Entom. Ital. Genova, LXI, 1929, pp. 75-94.
- FINZI B., 1939. — *Quinto contributo alla conoscenza della Fauna Mirmecologica della Venezia Giulia*. — Boll. Soc. Entom. Ital., Genova, LXXI, 1939, pp. 86-90, 1 gr. di figg.
- MENOZZI C., 1922. — *Nota complementare per la distinzione specifica di Camponotus herculeanus L. e ligniperda Latr.* — Boll. Soc. Entom. Ital., Genova, LIV, 1922, pp. 141-145.
- MENOZZI C., 1924. — *Res Mutinenses* — Formicidae. — Atti Soc. Nat. Mat. Modena, ser. 5, VIII, 1924, pp. 22-47, figg. 1-2.
- MÜLLER G., 1923. — *Le Formiche della Venezia Giulia e della Dalmazia*. — Boll. Soc. Adriat. Sc. Nat., Trieste, XXVIII, 1923, pp. 11-180.
- STARCKE A., 1939. — *Retouches sur quelques Fourmis d'Europe. I.* — *Plagiolepis xene nov. sp. et Pl. vindobonensis Lomnicki.* — Entom. Bericht., IX, 1936, pp. 277-279.

RIASSUNTO

Nella presente nota vengono indicate alcune nuove località di raccolta di 9 forme di Formiche italiane e viene segnalata una sottospecie di *Strongylognathus huberi*, For., probabilmente nuova.