P. Dept. Zool. Barcelona, 7: 67-71, 1981

# Nota sobre la entomofauna de la Sierra de Prades (Tarragona) (Formícidos)

por

ENRIC ALONSO DE MEDINA y XAVIER ESPADALER

En esta cuarta publicación de la serie dedicada a la entomofauna de la Sierra de Prades, nos referiremos al estudio de los Formícidos presentes en once de las localidades más representativas de la misma. Dichas localidades fueron ya descritas en trabajos anteriores (véase ALONSO DE MEDINA, 1979, 1980 y 1981) y están ordenadas de menor a mayor altitud, siendo las mismas: 1: Alcover. 2: La Riba. 3: Vilaplana. 4: Mas Gomis. 5: La Febró. 6: Capafonts. 7: Albiol. 8: Montral. 9: Prades. 10: La Mussara. 11: Els Motllats.

| *Especies* | *Localidades* | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1. Myrmica scabrinodis | — | $\dot{8}$ | — | — | — | — | $\dot{12}$ | — | — | $\dot{9}$ | — |
| 2. M. specioides | — | $\dot{8}$ | — | — | $\dot{17}$ | — | — | — | $\dot{17}$ | — | — |
| 3. Aphaenogaster gibbosa | — | — | — | $\dot{14}$ | — | — | $\dot{12}$ | — | — | — | — |
| 4. Messor structor | $\dot{13}$ | $\dot{8}$ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. M. capitatus | — | $\dot{8}$ | $\dot{9}$ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. M. bouvieri | $\dot{7}$ | — | $\dot{9}$ | $\dot{14}$ | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. M. barbarus | $\dot{7}$ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Pheidole pallidula | $\dot{7}$ | $\dot{15}$ | $\dot{9}$ | — | — | $\dot{11}$ | $\dot{6}$ | — | — | — | — |
| 9. Crematogaster auberti | — | $\dot{8}$ | — | — | — | — | $\dot{6}$ | — | — | $\dot{9}$ | $\dot{\dot{\dot{67}}}$ |
| 10. C. scutellaris | $\ddot{27}$ | $\dot{8}$ | — | — | — | — | — | $\dot{14}$ | — | — | — |
| 11. C. sordidula | $\dot{7}$ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Diplorhoptrum sp. | — | — | $\dot{9}$ | — | — | — | — | $\dot{14}$ | — | $\dot{9}$ | — |
| 13. Temnothorax recedens | — | $\dot{8}$ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Leptothorax fuentei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $\dot{9}$ | — |
| 15. L. rabaudi | $\dot{7}$ | — | — | — | — | — | — | | — | — | — |
| 16. L. racovitzai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $\dot{9}$ | — |