



Ryc. 40 - 49. Wycięcia krawędzi segmentów odwłoka właściwego *Formica polyctena* Först. (ryc. 40 - 43, 45, 46, 49), *F. pratensis* Retz. (ryc. 44) i *F. rufa* L. (ryc. 47, 48)
 Abb. 40 - 49. Einschnitte der Hinterleibsegmente bei *Formica polyctena* Först. (Abb. 40 - 43, 45, 46, 49), *F. pratensis* Retz. (Abb. 44) und *F. rufa* L. (Abb. 47, 48)

- k) *Formica polyctena* Först. (ryc. 50)
 VIII 1967 Nadleśnictwo Tułowice, Leśnictwo Przechód
- l) *Formica pratensis* Retz. (ryc. 51)
 VII 1976 Nadleśnictwo Gniezno, Leśnictwo Czachórki
- m) *Formica pratensis* Retz. (ryc. 52)
 VIII 1967 Nadleśnictwo Chrzelice, Leśnictwo Śródlesie
- n) *Formica pratensis* Retz. (ryc. 53)
 VII 1976 Nadleśnictwo Gniezno, Leśnictwo Czachórki
- o) *Formica pratensis* Retz. (ryc. 54)
 VIII 1967 Nadleśnictwo Chrzelice, Leśnictwo Śródlesie
- p) *Formica polyctena* Först. (ryc. 55)
 VIII 1967 Nadleśnictwo Chrzelice, Leśnictwo Jeleni Dwór
- q) *Formica pratensis* Retz. (ryc. 56)
 VII 1976 Nadleśnictwo Gniezno, Leśnictwo Czachórki

Bardzo często spotykano robotnice z deformacjami odwłoka właściwego, w postaci wycięcia krawędzi jednego lub kilku segmentów (ryc. 40 - 49). Wycięcia te są najczęściej półkoliste (ryc. 40, 42, 46), rzadziej mają one kształt bardziej nieregularny (ryc. 43, 44, 47). Często spotykano także deformacje w postaci zaniku fragmentu segmentacji odwłoka właściwego