

Es la especie más corriente en Menorca. Realmente se halla esparcida por toda la isla, desde el encinar interior hasta las playas y zonas arenosas litorales. Pero, a pesar, de este espectro ecológico tan amplio, donde tiende a concentrar su población es en la maquia y el erial del *Oleo-Ceratonion* e incluso la franja litoral. Escasea entre los pinos tanto dentro del *Quercion* como del *Oleo-Ceratonion*.

Subfamilia FORMICINAE

Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798)

Es una de las especies más corrientes en la isla juntamente con *T. nigerrium*, sin embargo, no coinciden en los biotopos preferenciales. Hallada en Maó y Pico de Toro por COLLINGWOOD y YARROW (1969).

— Primavera, abril-77: Es Grao (2), obreras en tierra arenosa bajo piedra, C. Capifort (3), obreras en tierra bajo piedras, B1. Tirant Nou (4), obreras en tierra bajo piedras, B3. Els Alocs (5), obreras y huevos, en tierra arenosa bajo piedras, B1. Na Vermella (7), obreras, en tierra bajo piedras, A2. Les Salines (7), obreras con larvas y pupas en tierra bajo piedras, B1 y B2. Santa Rita (9), obreras con larvas y reinas, en tierra bajo piedras, A1 y A3. Santa Isabel (10), obreras con huevos, larvas y reinas, en tierra bajo piedras, B3. Sa Roca (12), obreras en tierra bajo piedras, A1 y A3. Binifabini (12), obreras en tierra bajo piedras, A2. Fontanelles (13), obreras con huevos y reinas, en tierra bajo piedras, B1. Cavalleria (14), obreras con larvas y pupas, en tierra bajo piedras, B1. Tudons (16), obreras en T/P, B2. Son Saura (14), obreras en T/P, B3. Artrutx (17), obreras con huevos y larvas en T/P, B1. Son Xoriguer (17), obreras en tierra arenosa bajo piedras, C. Cala Galdana (18), obreras en T/P, A2. Torrente d'Algendar (18), obreras bajo corteza de raíz de lentisco. A1. Son Bou (19), obreras en tierra arenosa bajo piedra, C.

— Verano, agosto-76: S'Abassa (2), obreras en solitario, A1. Ferreries (8), obreras en tierra bajo piedras, A1. Son Morell (15), obreras en tierra con abundante humus bajo piedras, B2.

— Otoño, octubre-76: Es Grao (2), obreras sueltas, B1. Sant Felip (9), obreras en tierra con abundante humus bajo piedras, A1. Cala Galdana (18), obreras en tierra con humus, A2.

— Invierno, diciembre-76: Sant Jordi (2), obreras y larvas en T/P, B1. S'Enclusa (6), obreras en tierra con humus bajo piedras, A1. Ferreries (8), obreras con larvas y reina, en tierra con abundante humus, A2. Tudons (16), obreras en T/P, B2. Cala Galdana (18), obreras con reinas en agujero de piedra caliza mezcladas con *Aphaenogaster subterraneoides*, A2.

Se halla extendida por toda la isla, pero su biotopos preferido, donde es muy abundante, son el encinar ya con el estrato arbóreo encina o pinos y la maquia de Oleo tanto despejada como cubierta por pinos. Tiende a concentrar su población en localidades del interior. Su habitat es constante, presenta los nidos en tierra debajo de las piedras. Con frecuencia la tierra es muy rica en humus y con cierta humedad. Necesita de un cierto frescor en el suelo y para ello una cobertura vegetal bastante densa.