

скапус 0,52; эпинотум сверху: дл. 0,52; ш. 0,40; петиоль сверху: дл. 0,42; ш. 0,38; постпетиоль сверху: дл. 0,40, ш. 0,58; задняя голень 0,55; 5-й чл. жгутика усика: дл. 0,08, ш. 0,10; 6-й чл.: дл. 0,09, ш. 0,11.

Голова (рис. 2, а) узко-трапецевидная, почти прямолинейно сужена назад, с коротко закругленными задними углами и прямым затылочным




Рис. 2. *Amblyorone apinae* sp. n.; ♀
а — голова, б — торакс и брюшко сбоку

краем; передние углы почти прямоугольные, над ними сверху находится острый маленький зубчик. Мандибулы короче головы, слегка расширены в средней части, наружный их край слегка вогнут в середине; мощные зубы лежат в один ряд, 3—6-й (считая от основания) глубоко раздвоены. Наличник очень правильно закруглен на покатом переднем крае с 9 одинаковыми равномерно расположенными маленькими зубчиками. Глаза очень маленькие, из нескольких фасеток. Скапус умеренной толщины, жгутик массивный, все срединные его членики поперечные. Торакс (рис. 2, б) относительно длинный и низкий, основная поверхность эпинотума почти в 1,5 раза длиннее покато́й и переходит в нее под тупым углом. Петиоль широкий, массивный, в профиль его передняя поверхность слегка вогнута, угол торчащий, очень узко закруглен; постпетиоль почти равен петиолю, но значительно шире (см. пропорции).

Голова покрыта густыми грубыми морщинистыми точками; неясные морщинки между точками идут на темени и в задней части лба в поперечном направлении, ближе к бокам головы они направлены косо к длинной оси головы. Наличник, передняя часть усиковых впадин и лоб между лобными валиками в очень тонких правильных продольных штрихах, мандибулы не грубо продольно-морщинистые, скапус в густой шероховатой пунктировке. Грудь сверху гладкая и блестящая, с очень мелкими рассеянными точками и прилегающими волосками, бока мезонотума и эпинотума с нежной продольной, местами косой штриховкой.

Голова, петиоль и брюшко с частыми прилегающими волосками; на брюшке волоски короткие, но лежат довольно густо так, что расстояния между ними меньше длины волосков. Единичные тонкие отстоящие волоски на скапусе и голенях (особенно на нижней их стороне); в задней части петиоля и постпетиоля короткие наклонные волоски.

Красновато-оранжевый, конечности светлее.

Голотип-уникум: Туркмения, Кара-Кала, подножие г. Сюнт, 13 мая 1966 г. (Анна Тихомирова, именем которой и назван вид).

По размерам и форме головы сходен с мелкими *A. (S.) denticulata* Roger. Отличается строением наличника с мелкими равномерно расположенными зубчиками и скульптурой головы с заметной продольной и поперечной морщинистостью. Представитель этого в основном тропического рода впервые обнаружен в фауне СССР.