

В отличие от рисунка Эмери (С. Emery, 1908: 328; fig. 17, «cypriotes»), у наших муравьев эпинотум более низкий и основная поверхность гораздо длиннее покатой, а шипы развиты сильнее.

Рис. 6. *Aphaenogaster pallida* subterganeoides Em., ♀



А. (*A.*) *pallida armeniaca* K. Arnoldi sp. n.

♀. Муравьи из Армении, сходные в общем с предыдущими, выделяются несколькими существенными признаками: волоски на тораксе, стельке, брюшке такие же тонкие, как у *pallida*, но значительно короче; наличник с очень ясной срединной выемкой, более глубокой, чем у типа и *subterganeoides*; волоски на скапусе очень обильны и в дистальной половине, особенно на наружной стороне, оттопырены и приподняты под углом 45°; у других форм они, если слегка и приподняты, всегда направлены назад. Очень гладкий и блестящий, одноцветно светло-коричневый. 3,2—3,5 мм.

Армения: окрестности Еревана; Карабахлар; Мегри (Длусский, 1960). Голотип: Карабахлар № 932, 17 мая 1960 г. Описан по 15 ♀♀ из трех гнезд. ♂ и ♀ неизвестны. Дальнейшие материалы (♂ и ♀), возможно, покажут видовую самостоятельность этой формы. От *A. holtzi* Emery отличается скульптурой, тонкими волосками, отсутствием отстоящих волосков голени, приподнятыми волосками скапуса.

*Messor lamellicornis* K. Arnoldi sp. n.

Голотип (♀). Промеры: дл. головы 2,05; ш. за глазами (макс.) 1,9; ш. по границе с наличником 1,75; дл. глаза 0,55, дл. щеки 0,65; дл. скапуса 2,05; 1-й чл. жгутика усиков: дл. 0,3, ш. 0,14; 2-й чл.: дл. 0,23, ш. 0,09; 3-й чл.: дл. 0,18; торакс: дл. 2,7, выс. 1,0; задняя голень: дл. 2,6, максимальная ш. 0,28.

Индексы (среднее из 10♀♀):

$\frac{\text{ш.}}{\text{дл.}}$ головы 0,92 (0,90—0,95)	ш. за глазами передняя 1,07 (1,04—1,10)
дл. $\frac{\text{голова}}{\text{скапуса}}$ 0,99 (0,95—1,02)	жгутик $\frac{\text{дл.}}{\text{ш.}}$ 1 чл. 2,15 (2,08—2,23)
$\frac{\text{дл.}}{\text{ш.}}$ 2-го чл. 2,55 (2,45—2,66)	дл. $\frac{1\text{-го}}{2\text{-го}}$ чл. 1,25 (1,20—1,31)
дл. $\frac{1\text{-го чл.}}{3\text{-го чл.}}$ 1,58 (1,50—1,69)	дл. $\frac{\text{щеки}}{\text{глаза}}$ 1,15 (1,02—1,25)
торакс $\frac{\text{дл.}}{\text{выс.}}$ 2,95 (2,72—3,30)	задняя голень $\frac{\text{дл.}}{\text{ш.}}$ 11,0 (9,3—12,4)

♀. Характеризуется очень длинными конечностями с обильными отстоящими волосками, желтым цветом, слабым диморфизмом.

Голова (рис. 7, а) немного больше в длину, чем в ширину за глазами, от глаз вперед и назад слабо суживается, боковые края слабо выпуклые; глаза большие, плоские, лишь немного меньше щек; скапус примерно равен длине головы, выдается за затылочный край почти на длину 1,5 чл. жгутика; лопасть на основании очень большая, пластинкообразная (рис. 8, а), широко закруглена спереди. Членики жгутика усиков (рис. 8, б) длинные, 2—5-й примерно в 2,5 раза длиннее ширины, тонкие, 1-й чл. слегка больше 2-го и в 1,5 раза больше 3-го. Лобные валики короткие, довольно высокие, очень слабо расходящиеся. Торакс длинный,