

Erica cinerea, ed anche di *Agrostis setacea*, *Ulex minor*, *Molina coerulea*) dei quali consuma il germe (BRIAN, HIBBLE, STRADLING, 1965).

Tetramorium impurum FOERSTER praeocc.

EMERY (1925b: 178); KRATOCHVIL (1944: 65 = *gregori* syn. nov.); KUTTER (1977: 159).

G e o n e m i a : secondo KUTTER, forse simile a quella del *T. caespitum* L., secondo POLDI (osservazioni non ancora pubblicate) perlomeno dai Pirenei alla Polonia, dal Belgio all'Italia meridionale.

O s s e r v a z i o n i : una sola ♀ piccola (raccolta nella stazione 3) con nodo del peziolo stretto e letto dello scapo a scultura leggera e poco regolare, sembra ascrivibile a questa specie, per la quale — in assenza di forme sessuate — la determinazione resta come ipotesi da confermare.

Tapinoma erraticum (LATR.)

EMERY (1925c: 53); BARONI URBANI (1968b: 475); KUTTER (1977: 181).

G e o n e m i a : secondo EMERY: Europa continentale meridionale e media, parte meridionale dell'Inghilterra e della Svezia. Secondo BARONI URBANI, che riunisce sotto quest' unica denominazione anche forme già riconosciute autonome: *nigerrimum* NYL. *simrothi* KR. (e relative varietà): dalle Canarie in tutta Europa fino all'Inghilterra meridionale, alle isole di Oeland e Gotland, al Caucaso, al Turan, all'Afghanistan. Peraltro KUTTER risulta mantenere le divisioni classiche ed attribuisce alla specie una diffusione limitata all'Europa media e meridionale, dall'Inghilterra al Caucaso e all'Asia Media. Egli riconosce altresì validità alla specie *T. ambiguum* EM. differenziabile solo nei maschi, cui attribuisce una presenza nell'Europa media e meridionale, dall'Inghilterra alla Boemia (e Polonia: PISARSKI 1975).

O s s e r v a z i o n i : gli esemplari raccolti a Masserano (Rovasenda) rientrano tutti nell'ambito delle dimensioni che EMERY assegna alla subsp. *erratica* LATR..

N o t e e t o l o g i c h e : la specie risulta preferire località secche, soleggiate: secondo DONISTHORPE in Inghilterra si trova principalmente in luoghi sabbiosi. Per BERNARD (1968) l'igropreferendum costituirebbe un punto di netta distinzione tra il *T. erraticum* LATR. ed il *T. nigerrimum* NYL. e *T. simrothi* KR.; queste due ultime specie preferirebbero insediarsi in terreni umidi ed argillosi, poco inclinati. Tale opinione non risulta confermata.

Hypoclinea quadripunctata (L.)

EMERY (1916: 210); STITZ (1939: 210).

G e o n e m i a : Europa media e meridionale, dalla Spagna al Caucaso (salva poi la verifica della validità della subsp. *sibirica* EM.: vedasi in argomento le riserve di WHEELER 1933); in Italia dal nord fino alla Calabria.

O s s e r v a z i o n i : un unico reperto — 11 esemplari — nella stazione 6.

N o t e e t o l o g i c h e : questa specie colonizza usualmente i rami delle querce scavati da gallerie ad opera di larve di vari longicorni: il reperto sopracitato appare da correlarsi con la presenza di *Quercus robur* in quella stazione.