

Tabella II -- Prospetto della mirmecofauna nota per la brughiera di Masserano e di quella risultante per la brughiera di Poole Basin (Dorset) secondo i dati di BRIAN 1964.

Prospect of the myrmecofauna known so far about the heath of Masserano, and as resulting from the studies carried out by M. V. BRIAN 1964 on the heath of Poole Basin, Dorset.

SPECIE	Masser.	Dorset	Annotazioni
<i>Myrmica ruginodis</i> NYL.	?	+	raccolta nella brughiera militare
" <i>scabrinodis</i> NYL.	+	+	
" <i>sabuleti</i> MEIN.	++	+	
(<i>Diplorhoptrum fugax</i> (LATR.))	(.)		
<i>Tetramorium caespitum</i> (L.)	+	+++	
" <i>impurum</i> FOERST.	?		
<i>Strongylognathus testaceus</i> (SCH.)		+	parassite di <i>Tetramorium</i>
<i>Anergates atratulus</i> (SCHENCK)		+	
<i>Tapinoma erraticum</i> (LATR.)	+++	+	
<i>Hypoclinea quadripunctata</i> (L.)	+		non segnalata in Inghilterra
<i>Camponotus piceus</i> (LEACH)	+++		" " " "
" <i>aethiops</i> (LATR.)	+		" " " "
<i>Lasius niger</i> (L.)	+++	+++	
" <i>alienus</i> (FOERST.)	+++	+++	
" <i>flavus</i> (F.)		+	
<i>Formica transcaucasica</i> NASS.		+	assai rara in Italia (torbiere)
" <i>fusca</i> L.	+	++	
" <i>cunicularia</i> LATR.	++	+	
" <i>rufibarbis</i> F.	+		segnalata solo nel Surrey
" <i>pratensis</i> RETZ.	+		assai rara nell'Inghilterra merid.
" <i>sanguinea</i> LATR.	++		

4 – formiche di improbabile reperimento a Masserano

Anergates atratulus

Formica transcaucasica

5 – formiche di possibile reperimento nel Dorset

Formica sanguinea

6 – formiche di improbabile reperimento nel Dorset

Formica pratensis, *F. rufibarbis*

Sostanzialmente quindi può, dirsi che le due brughiere appaiono popolate da assai simili associazioni di formiche, tra le quali i taxa ad ampia valenza ecologica che si trovano in pascoli elevati di montagna (BARONI URBANI 1969) e specie a tendenza orofila