

Nido	Localidad	Fecha	Obreras	Reina	Prof.	Sup. A	Nº Cámaras	Especie
I	Cenes	13/III	109	1	37	423	3	rosenhaueri
II	Cenes	19/VII	549		43	543	8	"
III	Cenes	21/VII	609	1	42	510	8	"
IV	Cenes	27/VII	813	1	43,5	1169	15	"
V	Cenes	3/VIII	656		57,5	1219	19	"
VI	Cenes	17/VIII	1138		49	1650	13	"
XV	Cenes	5/VIII	748	1	48	264	15	"
XVI	Cenes	24/IX	1180	1	59,5	1530	14	"
XVII	Cenes	1/X	498		41	1196		"
XVIII	Cenes	4/X	1088	1	68	687	21	"
XX	Cenes	6/X	597	1	36	272	11	"
VII	Trevez	18/IX	458		29	700	7	iberica
VIII	Trevez	18/IX	707	1	34	1152	18	"
IX	Trevez	2/X	467	1	29	552	8	"
X	Trevez	2/X	256	1	24,5	240	7	"
XIX	Lanjarón	13/X	928	1	36	725	8	"
XXI	Orgiva	8/X	393	1	28,5	360	13	"
XXII	Orgiva	11/X	954	1	37,5	714	8	"
XXIII	Tablate	22/X	1369	1	36,5	662	13	"
XXIV	Tablate	29/X	509		24,5	408	12	"

Tabla 1: Relación de hormigueros levantados de cada una de las especies. La profundidad ya expresada en cm. y la superficie ocupada por las cámaras superficiales (= Sup. A) en cm<sup>2</sup>.

Table 1: List of the excavated nests of every species in Granada. The depth and the surface occupied by the superficial chambers (= Sup. A) are measured in cm. and cm<sup>2</sup> respectively.




Figura 2: Representación del hormiguero IV de *C. rosenhaueri* (1) y del VIII de *C. iberica* (2). Se representa el alzado vertical y el horizontal; en este último la superficie ocupada por las cámaras superficiales se encierra dentro del rectángulo (—) y la ocupada por las de la galería principal se incluyen en el(los) rectángulo(s) (—). (\* = entrada del hormiguero).

Figure 2: Drawing of the IV nest of *C. rosenhaueri* (1) and VIII one of *C. iberica* (2). The horizontal plain of every one is also represented and which shows the area occupied by the superficial chambers (—) and by the principal gallery (—). (\* = entry hole of the nest).