

JOH. CHRIST. FABRICII

HIST. NAT. OECONOM. ET CAMERAL. P. P. O. SOC. IMP.  
NAT. CURIOS. HAFN. NORW. BEROL. LIPS. OECON. LUND.  
PETROP. TAURIN. JENENS. LOND. HIST. NAT. NEC NON  
PARIS. AGRICULT. HIST. NAT. ET PHILOM. MEMBR.

# SUPPLEMENTUM

ENTOMOLOGIAE SYSTEMATICAE.

---

H A F N I A E ,

ABUD PROFT ET STORCH.

MDCCLXXXVIII.

1798

FORMICA. *Palpi* inaequales: articulis cylindricis.

*Labium* submembranaceum, cylindricum, apice palpigerum.

*Antennae* filiformes.

9—10. F. atra abdomine cinereo sericeo, thorace sericeo, postice bidentato.

Habitat in Senegalia Mus. Dom. Bose.

Statura F. nigrae. Caput magnum, atrum antennarum primo articulo basi rufo. Thorax niger, postice compressus, canaliculatus terminatus denticulis duobus obtusis. Abdomen subglobosum, cinereo nitidum, sericeum. Pedes nigri.

11—12. F. nigra thorace abdominis primo segmento ferruginea, femoribusque ferrugineis.

Habitat in America.

Statura F. rufae at duplo maior, Caput magnum, glabrum, nigrum. Thorax compressus, ferrugineus squama integerrima, ovata. Abdomen hirtum, fuscum primo segmento ferrugineo. Pedes nigri femoribus ferrugineis.

27—8. F. nigra pedibus ferrugineis, abdomine conico, conico.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

F. pallipes paullo maior. Corpus atrum, nitidum pedibus solis rufis. Abdomen conicum, acutum squama integerrima ovata, obtusa.

- cylindrica.* 31—2. F. atra capite cylindrico rufo: ore atro.  
Habitat in India Mus. Dom. Bosc.  
Media. Caput magnum, cylindricum, rufum  
ore atro.  
Mandibulae exsertae, intus dentatae. Thorax  
parum compressus, ater. Abdomen cylin-  
dricum, atrum, immaculatum. Pedes ni-  
gri. Alae obscurae.
- flauicornis.* 38—9. F. thorace hirtio ferrugineo nigra anten-  
nis apice flauis.  
Habitat Cajennae.  
Magna, elongata. Caput nigrum, obscurum  
mandibulis porrectis, apice incrassatis, ob-  
lique truncatis, ferratis. Antennae nigrae,  
apice flauae. Thorax pilis densis ferrugi-  
neis tectus. Petiolus breuis, basi pari tuber-  
culorum obtusorum. Squama integerrima  
crassa, latissima. Abdomen ouatum, obscu-  
rum. Pedes nigri. Alae subferrugineae.
- tarfata.* 38—9. F. thorace inermi nigra tarsis anticis sub-  
tus rufo hirtis.  
Habitat in Insula Goré Africae Dom. Bosc.  
Statura et magnitudo praecedentis tota nigra,  
immaculata, distincta tarsis anticis rufo  
hirtis.
- stubercula-* 38—9. F. thorace inermi ferruginea mandibulis  
*ta.* exsertis dentatis, petiolo binodi.  
Habitat Cajennae Mus. Dom. Bosc.  
Praecedentibus minor. Corpus totum pilosum,  
ferrugineum. Petiolus elongatus tuberculis  
duobus eleuatis.

42—3. F. thorace antice bispinoso. nigra mandi-*fungosa*.  
bulis exsertis apice truncatis ferratis.

Habitat Cajennae in nidis magnis, fungosis e  
tomento plantarum confectis.

Parua. Caput medium, ovatum, nigrum an-  
tennarum primo articulo ferrugineo. Man-  
dibulae exsertae, truncatae, ferratae. Tho-  
rax antice utrinque spina valida armatus, ni-  
ger, immaculatus. Abdomen rotundatum,  
atrum.

MUTILLA. Palpi articulis obconicis.

*Labium* porrectum, cor-  
neum, obconicum, api-  
ce palpigerum.

*Antennae* filiformes.

13—14. M. nigra abdomine puncto dorsali fas-*dorsata*.  
ciisque albis.

Habitat in Americae Insulis Mus. Dom. Bosc.

Caput et thorax atra, immaculata. Abdomen  
hirtum, atrum macula magna dorsali secun-  
di segmenti apicibusque approximatis reli-  
quorum segmentorum albis. Pedes nigri.

19—20. M. hirta nigra thoracis margine antico *pedemon-*  
cinereo, abdominis secundo segmento rufo *tana*.  
posticeque fasciis duabus cinereis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

M. italica duplo minor. Caput atrum. Tho-  
rax niger margine antico scutelloque cine-  
reis. Abdomen conicum segmento secundo