

## 江口克之 ボルネオ産オオズアリ属の再検討（昆虫綱、膜翅目、アリ科、フタフシアリ亜科）

オオズアリ属（昆虫綱、膜翅目、アリ科）は熱帯および亜熱帯の森林の林床部において優占的なアリの一群である。この論文において、東南アジア熱帯に位置し世界で3番目に大きな島であるボルネオ島に生息する本属の種を分類類学的に再検討した。23新種を含む以下の52種がボルネオ島から確認された：*Pheidole acantha* 新種, *P. aglae* Forel, *P. angulicollis* 新種, *P. annexus* 新種, *P. aristotelis* Forel, *P. bugi* Wheeler, *P. butteli* Forel, *P. cariniceps* 新種, *P. cingulata* (Fr. Smith), *P. clypeocornis* 新種, *P. comata* Fr. Smith, *P. deltea* 新種, *P. elisae* Emery, *P. fantasia* Chapman, *P. fervens* Fr. Smith, *P. ghigii* Emery, *P. gombakensis* 新種, *P. havilandi* Forel, *P. hortensis* Forel, *P. huberi* Forel, *P. inornata* 新種, *P. kikutai* 新種, *P. lokitae* Forel, *P. longipes* (Fr. Smith), *P. luciooccipitalis* 新種, *P. manukana* 新種, *P. megacephala* (Fabricius), *P. merimbun* 新種, *P. modiglianii* Emery, *P. montana* Eguchi, *P. orophila* 新種, *P. parvicorpus* 新種, *P. plagiaria* Fr. Smith, *P. planidorsum* 新種, *P. plinii* Forel, *P. poringensis* 新種, *P. quadrensis* Forel, *P. quadricuspis* Emery, *P. quinata* Eguchi, *P. rabo* Forel, *P. reticulatus* 新種, *P. rugifera* 新種, *P. sabahna* Eguchi, *P. sarawakana* Forel, *P. sauberi* Forel, *P. sayapensis* 新種, *P. spinicornis* 新種, *P. submonticola* 新種, *P. tavaauensis* 新種, *P. tenebricosa* 新種, *P. tjibodana* Forel, *P. upeneci* Forel, *P. bugi*, *P. fantasia* および *P. javana* var. *desucta* Wheelerについてレクトタイプが指定された。*P. elisae* var. *nenia* Forel, 1913は*P. elisae* Emery, 1900の、そして*P. javana* var. *desucta* Wheeler, 1929は*P. fervens* Fr. Smith, 1858のジュニアシノニムであると確認された。大型ワーカー、小型ワーカー、大型および小型ワーカーに基づく種の検索表を提示した。大半の種について分布および生態情報を示した。最後にインド-シナ亜区およびインド-マレー亜区におけるオオズアリ相に見られるいくつかの特徴について生物地理学的な観点から解説を試みた。