

Echan-  
tillons

Diptera

Fam. des Mycetophilidae <i>Sciara</i> sp. ....	1
Bibionidae <i>Plecia longiventris</i> N. TH.	3
<i>superba</i> N. TH. ....	4
<i>angustiventris</i> N. TH. ....	15
<i>Försteri</i> N. TH. ....	16 (+ 1)
cf. <i>longa</i> HEER ....	2
<i>splendida</i> N. TH. ....	5
<i>Dumasi</i> N. TH. ....	1
<i>graciliventris</i> N. TH. ....	1
<i>varia</i> N. TH. ....	1
<i>Bibio celasensis</i> N. TH. ....	13 + 1 centaine
<i>obtusa</i> N. TH. ....	8
<i>tenuiapicalis</i> N. TH. ....	2
<i>elongatipennis</i> N. TH. ....	2
cf. <i>conformans</i> N. TH. ....	1
<i>macerata</i> N. TH. ....	4
? ....	1 + 1 vingtaine
Tipulidae <i>Tipula Marioni</i> ♀ N. TH. ....	1
<i>indura</i> ♂ N. TH. ....	2
sp. ....	1
Rhagionidae <i>Atherix Saunieri</i> ♀ N. TH. ....	1
Therevidae <i>Thereva Marcelini</i> ♂ N. TH. ....	1
Syrphidae ....	1

Hemiptera

Fam. des Pentatomidae <i>Nezara latitesta</i> N. TH. ....	1
Lygaeidae <i>Lygaeus celasensis</i> N. TH. ....	1

7 ordres, 23 familles, 34 + ? genres, 50 + ? espèces, 131 éch. (plus de 350 si on tient compte des Bibionidae couvrant des plaques entières).

2° L'élément dominant de cette faune est formé par les Bibionidés, Diptères floricoles dont les larves sont aquatiques. Les eaux étaient peuplées en plus par les larves d'*Atherix* vivant sous les crevasses des vieux bois flottants, par l'*Atherma rardonis*, par des Dytiques et des Hydrophiles (*Enochrus striatus* N. TH.) faisant la chasse aux larves des Diptères.

Au-dessus des eaux voltigiaient les Libellulidés, *Lestes regina* N. TH., au vol lourd, se posant fréquemment sur les