

	Kleinheims	Brunnstatt	Célas	Corent	Aix	Rott	Raddoij	Oeningen	Anbre balt.	Types de comparaison
Chrysomelidae										
<i>Donacia dubia</i> N. TH.	1	1								
— <i>disjecta</i> F.										
* <i>Cryptocephalus Pitoni</i> N. TH.	1	1								
* <i>Psilolydes difficilis</i> F.	4	1								
* — <i>defiguratus</i> N. TH.	1									
<i>Haltica dubia</i> F.		1								
— <i>magna</i> F.										
* <i>Chrysolochla pulchra</i> F.	1									
* <i>Galerucella emarginata</i> N. TH.	1									
— <i>affinis</i> F.		1								
— <i>sp.</i>	1									
* <i>Cassida Kramstae</i> F.			(1)		R					
<i>Agelasa sessilis</i> F.			1							
Cerambycidae										
* <i>Saperda densipunctata</i> N. TH.	1									
<i>Cerambycites</i> sp. F.?			1							
Bruchidae										
* <i>Bruchus crassus</i> F.			1							
— <i>cf. pisi</i> L.			1							
Curculionidae										
* <i>P. yllobius pulchellus</i> F.			(1)							
* <i>Lachnopus dilatatus</i> N. TH.	1									
* <i>Sitona lata</i> N. TH.	1									
* — <i>cf. margarum</i> GERM.										
* <i>Cleonus Försteri</i> N. TH.	1		1							
— <i>cf. sexsulcatus</i> HEER			1							
— <i>sp.</i>	1									
* <i>Baridium naviculare</i> F.										
<i>Hylobius</i> sp.	1		1							
* <i>Tychius latus</i> F.			1							
* <i>Larinus longirostris</i> F.			1							
* <i>Apion sulcatum</i> F.			1							
* — <i>levirostre</i> F.										
* — <i>parvum</i> F.										
* — <i>primordiale</i> HEYD.			1							
<i>Cryptorrhynchus incertus</i> F.			1							
* <i>Ceutorrhynchus Miegi</i> N. TH.	1									
* — <i>Fischeri</i> F.			2							
— <i>crassirostris</i> F.										
<i>Gymnetron prolixaicole</i> F.			1							
? <i>Pissodes planatus</i> F.			1							
* <i>Pagous palintonus</i> F.										
* — <i>bicolor</i> F.										
<i>Urodon cinctus</i> F.										
* <i>Smicronyx antiquus</i> F.										
<i>Curculionites</i> cf. <i>lividus</i> HEER			1							
Phyngophores inc. sed.	1									
Coleoptera inc. sed.	16	24								
Hymenoptera	> 00	100								
Ichneumonidae										
* <i>Parapimpla r. enana</i> N. TH.	1									
* <i>Pimpla Seyrigi</i> N. TH.	1									
* — <i>indura</i> N. TH.	1									
* <i>Cremastus primus</i> N. TH.	1									
<i>Ichneumon pieromajus</i> N. TH.	1									
Braconidae										
* <i>Bracon diffusiventris</i> N. TH.	1									
— <i>induratum</i> N. TH.		1								
— <i>praeteritus</i> F.		1								
Chrysidae										
* <i>Chrysida amoena</i> F.			1							
Mutillidae										
<i>Methoca</i> sp.	1									
<i>Mutilla tenera</i> F.	1		1							
Formicidae										
Poneridae										
* <i>Lioponera</i> sp.			1							
<i>Brachyponera dubia</i> ♀ N. TH.	1									
* <i>Platythyrea</i> cf. <i>primaeva</i> WHEELER	1									
* <i>Euponera globiventris</i> N. TH.	3									
* — <i>calcarea</i> ♂ N. TH.	4									
— <i>cf. calcarea</i> ♀ N. TH.	12									
										g. éthiopien et oriental
										<i>P. wrongtoni</i> FOR. Indes
										genre tropicopolitain