

PLANCHE XIII

Insectes du Sannoisien de Kleinkembs et de Brunnstatt

- FIG. 1. *Orthacanthacris rhenana* N. TH. Holotype, éch. R150, $\times 1,8$;
p. 160.
— 2. *Ectobius* sp. éch. R782, $\times 3,5$; p. 161.
— 3. *Quedius rhenanus* N. TH. Holotype, éch. R654, $\times 2,2$; p. 166;
3a: antenne; 3b: extrémité de l'abdomen.
— 4. *Oligamphotis Irenaei* N. TH. Holotype, éch. R336, $\times 15$;
p. 171.
— 5. *Parapimpla rhenana* δ N. TH. Holotype, éch. R403, $\times 3,5$;
5a: ailes du même; p. 191.
— 6. *Pimpla Seyrigi* δ N. TH. Holotype, éch. R214, $\times 3$; 6a:
éch. R578, contre-empreinte du précédent; 6b: ailes de
R578; p. 192.
— 7. *Pimpla indura* N. TH. Holotype, éch. R865, $\times 3$; p. 193.
— 8. *Cremastus primus* φ N. TH. Holotype, éch. R939, $\times 2,4$;
8a: aile ant.; p. 193.
— 9. *Ichneumon pteromajus* N. TH. Holotype, éch. Bt28, $\times 7,5$;
p. 194.
— 10. *Bracon diffusiventre* N. TH. Holotype, éch. R453, $\times 3,1$;
p. 194.
— 11. *Bracon induratum* N. TH. Holotype, éch. Bt27, $\times 7,5$; p. 195.
— 12. *Methoca* sp. éch. R20, $\times 3,1$; p. 195.
— 13. *Methoca* sp. éch. R358, $\times 3$; p. 195.
— 14. *Lioponera* sp. φ éch. R209, $\times 3$; p. 196.
— 15. *Platythyrea* cf. *primaeva* WHEELER éch. R110, $\times 3,8$; p. 197.
— 16. *Euponera globiventris* φ N. TH. Holotype, éch. R609, $\times 3$;
p. 198.
— 17. *Euponera calcarea* δ N. TH. Holotype, éch. R147, $\times 3$;
p. 198.
— 18. *Euponera* cf. *calcarea* φ N. TH. Holotype, éch. R743, $\times 3,1$;
p. 199.
— 19. *Sima Klebsi* WHEELER éch. R509, $\times 3$; p. 199.
— 20. *Solenopsis maxima* δ FÖRSTER emend. TH. éch. R724, $\times 3,3$;
p. 200.