

convexum a mesonoto convexo in medio paulo deplanato impressione separatum; metanotum densissime parte declivi subtiliter dense transverse striolatum; petioli squama erecta, incrassata, antice convexa, postice plana, margine superiore rotundato; abdomen inter segmentum primum et secundum haud constrictum.

A speciebus generis *Ponera* funiculi articulis 7 basalibus longioribus quam crassioribus, thorace inter mesonotum et metanotum constricto, metanoti parte declivi transverse striolato et petiolo squamiformi distincta.

Platythyrea Rog.

P. inconspicua Mayr. Neue Form. 1870, 23.

Ectatoma Smit.

E. quadridens F. E. S. II, 362.

E. tuberculatum Lat. Hist. Four., 210.

Paraponera.

P. clavata F. S. E. 394.

Pachycondyla Smit.

P. crassinoda Lat. Hist. Four. 198.

P. foetida Oliv. E. Meth. VI, 502.

P. commutata Rog. Ber. E. Z. 260, 311.

P. unidentata Mayr. Wien. Z. B. G. 1862, 720.

Leptogenys Rog.

L. arcuata Rog. Ber. E. Z. 1861. 30.

Gnamptogenys Rog.

G. striatula Mayr n. sp.

Operaria: Long 4,3 — 4,6^{mm}. Fusco-nigra (nonnunquam partim castanea), mandibulis, antennis pedibusque castaneo —